(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 27. Oktober 2005 (27.10.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/100352 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: C07D 471/04, 235/26, 249/12, 495/04, 401/14, 487/08, 471/08, 451/04, 519/00, A61K 31/437, 31/4184, 31/4196, 31/519, 31/551, A61P 25/06
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/003759
- (22) Internationales Anmeldedatum:

9. April 2005 (09.04.2005)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

- (30) Angaben zur Priorität: 10 2004 018 796.7 15. April 2004 (15.04.2004) DE
- (71) Anmelder (nur für AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BE, BF, BG, BJ, BR, BW, BY, BZ, CA, CF, CG, CH, CI, CM, CN, CO, CR, CU, CY, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, FR, GA, GB, GD, GE, GH, GM, GN, GQ, GR, GW, HR, HU, ID, IE, IL, IN, IS, IT, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MC, MD, MG, MK, ML, MN, MR, MW, MX, MZ, NA, NE, NI, NL, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SI, SK): BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH [DE/DE]; Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim/Rhein (DE).
- (71) Anmelder: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG [DE/DE]; Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): RUDOLF, Klaus [DE/DE]; Oeschweg 11, 88447 Warthausen (DE).
 MUELLER, Stephan Georg [DE/DE]; Maelzerstrasse 13, 88447 Warthausen (DE). LUSTENBERGER, Philipp [CH/DE]; Maelzerstrasse 8, 88447 Warthausen (DE).

STENKAMP, Dirk [DE/DE]; Bonifaz-Locher-Weg 8, 88400 Biberach (DE). SCHAENZLE, Gerhard [DE/DE]; Sophie von La Roche Weg 10, 88400 Biberach-Mettenberg (DE). ARNDT, Kirsten [DE/DE]; Vorarlberger Strasse 51, 88400 Biberach (DE). DOODS, Henri [NL/DE]; Freiherr-von-Koenig-Str. 6, 88447 Warthausen (DE).


- (74) Gemeinsamer Vertreter: BOEHRINGER INGEL-HEIM INTERNATIONAL GMBH; Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim/Rhein (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\u00fcr \u00e4nderungen der Anspr\u00fcche geltenden Frist; Ver\u00f6ffentlichung wird wiederholt, falls \u00e4nderungen eintreffen

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: SELECTED CGRP-ANTAGONISTS, THEIR PREPARATION PROCESSES AND THEIR USE AS MEDICAMENTS
- (54) Bezeichnung: AUSGEWÄHLTE CGRP-ANTAGONISTEN, VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG SOWIE DEREN VERWENDUNG ALS ARZNEIMITTEL



- (57) Abstract: CGRP-antagonists are disclosed having the general formula (I), in which A, X and R¹-R³ have the definition given in claim 1, as well as their tautomers, diastereomers, enantiomers, hydrates, mixtures and salts, as well as their salt hydrates, in particular their physiologically compatible salts with inorganic or organic acids, medicaments containing these compounds, their use and their preparation processes.
- (57) Zusammenfassung: Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind die CGRP-Antagonisten der allgemeinen Formel (I) in der A, X und R¹ bis R³ wie in Anspruch 1 definiert sind, deren Tautomere, deren Diastereomere, deren Enantiomere, deren Hydrate, deren Gemische und deren Salze sowie die Hydrate der Salze, insbesondere deren physiologisch verträgliche Salze mit anorganischen oder organischen Säuren, diese Verbindungen enthaltende Arzneimittel, deren Verwendung und Verfahren zu ihrer Herstellung.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Ausgewählte CGRP-Antagonisten, Verfahren zu deren Herstellung sowie deren Verwendung als Arzneimittel

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind die CGRP-Antagonisten der allgemeinen Formel

$$R^1$$
 N
 X
 A
 R^2
 N
 R^3
 R^3
 R^3

deren Tautomere, deren Diastereomere, deren Enantiomere, deren Hydrate, deren Gemische und deren Salze sowie die Hydrate der Salze, insbesondere deren physiologisch verträgliche Salze mit anorganischen oder organischen Säuren, diese Verbindungen enthaltende Arzneimittel, deren Verwendung und Verfahren zu ihrer Herstellung.

15 In der obigen allgemeinen Formel (I) bedeuten

A einen Rest der Formel

5

20

X ein Sauerstoffatom, eine Methylen- oder NH-Gruppe,

R¹ einen Rest der Formel

5 -NR²R³ einen Rest der Formel

10

15

Besonders bevorzugte Verbindungen der obigen allgemeinen Formel (I) sind beispielsweise folgende:

2 0 0 0 0 152

6 CI 156

7 CINCOLON 157

8 CIN 158

12 162

31 cl 181

33 183

35 CI NON 185

36 186

CI-CI-CN

38 CI NON 188

39 cl

40 ci N 190

41 191

43 PN-N-ON 193

CI-CI-CI-CV

	l cl	1	,, Br
601		751	
602		752	F-F-S-10-10
603		753	F T T
604	F-F-N-00-N-N	754	F-F-C
605		755	
606		756	
607		757	
608		758	
609		759	
610		760	

611	761	
612	762	
613	763	
614	764	
615	765	
616	766	
617	767	
618	768	
619	769	
620	770	

			N Gi
621		771	
622		772	
623		773	
624		774	
625		775	
626		776	
627		777	
628		778	
629		779	
630	CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-C	780	

	T		
631		781	CI-CI-CI-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N
632		782	
633	CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-C	783	
634		784	
635		785	
636	5	786	
637		787	
638		788	
639	C1 C	789	
640		790	

	Cl		
641		791	
642		792	
643	0 - C - C - C - C - C - C - C - C - C -	793	
644		794	
645		795	s
646		796	
647		797	
648		798	
649		799	
650		800	

		· r		
651		801		51
652	~5 ~1.~0~0	802		52
653		803		53
654		804		54
655		805		55
656		806		56
657		807		57
658		808	" \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	58
659	~3,~~3,~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	809		59
660		810		60

661	811	
662	812	
663	813	
664	814	F
665	815	
666	816	
667	817	
668	818	
669	819	
670	820	

	· ·	,	
671		821	
672		822	
673		823	
674		824	CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-C
675		825	
676		826	
677		827	
678		828	
679		829	
680		830	= CN-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

681		831	
682		832	
683		833	
684		834	
685		835	
686		836	
687	C1-C1-C1-C1-C1-C1-C1-C1-C1-C1-C1-C1-C1-C	837	
688		838	
689		839	
690		840	

691		841	
692		842	
693		843	
694		844	
695		845	
696		846	
697		847	
698		848	
699		849	
700	CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-C	850	

701	CITY CHONON	851	
702		852	
703		853	
704		854	
705		855	
706		856	CI -
707		857	
708		858	
709		859	
710		860	

	1		•
711		861	
712		862	
713		863	
714		864	N
715		865	F
716		866	
717		867	
718		868	
719		869	CI
720		870	C1 C

		·r	
721	CI-CI-CI-CI-CI-	871	
722		872	
723		873	C1-X
724		874	
725		875	
726		876	
727		877	
728	CIL NON-NON-NON-NON-NON-NON-NON-NON-NON-NON	878	
729		879	F
730	CI	880	

	II.		
731		881	
732		882	
733		883	CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-C
734		884	C1 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
735		885	
736		886	
737		887	
738		888	
739		889	
740		890	F

741		891	
742		892	
743		893	
744		894	F F C1
745	N S N N N N N N N N N N N N N N N N N N	895	
746	N-CN-OS-NO-NON	896	
747		897	
748		898	
749	CI-CI-CV	899	
750		900	

			
901		1051	
902		1052	
903		1053	
904	CI C	1054	
905		1055	
906	F PF	1056	
907		1057	
908		1058	
909		1059	
910	F TO NON-ON	1060	

	(1		
911		1061	CI-D
912	F N	1062	CI
913		1063	
914	F F N SI	1064	
915	F F N N N N N N N N N N N N N N N N N N	1065	
916		1066	
917		1067	
918		1068	N C 1 N N N N N N N N N N N N N N N N N
919		1069	
920		1070	

921		1071	
922		1072	
923		1073	
924		1074	
925		1075	F
926	FFF FFF N-O-N-N	1076	
927		1077	
928		1078	
929		1079	
930	F	1080	

	C		
931		1081	F
932		1082	
933		1083	
934		1084	
935	F	1085	
936		1086	
937		1087	
938		1088	
939		1089	
940		1090	

		Ţ	
941		1091	
942		1092	
943		1093	
944		1094	
945		1095	
946		1096	
947	CI-CI-CI-CI-CN-	1097	
948		1098	CI N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
949		1099	
950		1100	

951	1101	
952	1102	
953	1103	
954	1104	
955	1105	
956	1106	
957	1107	
958	1108	
959	1109	
960	1110	

961		1111	
962		1112	
963		1113	
964		1114	
965	S N O O N O N O N	1115	
966	s Ch	1116	F P N N N N N N N N N N N N N N N N N N
967		1117	
968		1118	
969		1119	
970		1120	

971	1121	
972	1122	
973	1123	CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-C
974	1124	
975	1125	
976	1126	
977	1127	
978	1128	F F N N N N N N N N N N N N N N N N N N
979	1129	
980	1130	

		,	
981		1131	
982		1132	CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-C
983		1133	
984		1134	
985	F POINT	1135	C1
986	F-F-ON-ON-ON	1136	
987		1137	
988		1138	F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
989		1139	
990		1140	

991	1141	
992	1142	
993	1143	
994	1144	
995	1145	
996	1146	
997	1147	
998	1148	
999	1149	
1000	1150	

	T	,	
1001		1151	
1002		1152	
1003		1153	
1004		1154	
1005		1155	
1006	F	1156	
1007		1157	
1008		1158	
1009		1159	
1010		1160	

	<u></u>		
1011		1161	
1012		1162	F F N-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON
1013		1163	
1014		1164	
1015		1165	
1016		1166	
1017		1167	
1018		1168	
1019		1169	F-F
1020		1170	

1021	C1-15-10-0-	1171	
1022		1172	
1023		1173	
1024		1174	
1025		1175	
1026	CI NO	1176	
1027		1177	
1028		1178	
1029		1179	
1030		1180	

		,	,
1031		1181	
1032	F-F	1182	F-F-00-00-00
1033		1183	
1034		1184	
1035		1185	
1036		1186	
1037		1187	
1038		1188	
1039		1189	
1040		1190	

Γ	T		
1041		1191	
1042		1192	
1043		1193	·
1044		1194	
1045		1195	
1046		1196	
1047		1197	
1048		1198	
1049		1199	
1050		1200	

1201		1351	
1202		1352	
1203		1353	
1204		1354	
1205		1355	
1206		1356	
1207		1357	
1208		1358	
1209		1359	
1210	F N SI	1360	

1211	CI-N-N-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON	1361	
1212		1362	
1213		1363	
1214		1364	
1215		1365	
1216		1366	
1217		1367	
1218		1368	
1219		1369	
1220		1370	

1221		1371	
1222		1372	
1223	F + 0 - N - N - N - N - N - N - N - N - N -	1373	
1224		1374	
1225		1375	
1226		1376	F
1227		1377	
1228		1378	
1229		1379	
1230		1380	F

	,	
1231	1381	
1232	1382	CI C
1233	1383	
1234	1384	
1235	1385	S NO
1236	1386	
1237	1387	
1238	1388	
1239	1389	
1240	1390	

			• .
1241	FFN-CN-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON	1391	
1242		1392	
1243		1393	
1244		1394	
1245		1395	
1246		1396	
1247		1397	
1248		1398	
1249		1399	
1250		1400	

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1251		1401	
1252		. 1402	
1253		1403	
1254		1404	
1255		1405	
1256		1406	
1257		1407	
1258		1408	
1259		1409	
1260	F # 50 N N N N N N N N N N N N N N N N N N	1410	

1261	F	1411	
1262	F	1412	
1263		1413	
1264		1414	
1265		1415	
1266		1416	
1267		1417	
1268		1418	
1269		1419	
1270		1420	

	2		;
1271		1421	
1272		1422	
1273		1423	
1274		1424	
1275		1425	
1276		1426	
1277		1427	
1278		1428	
1279		1429	
1280		1430	

		,	
1281		1431	* F S
1282	F F N CI	1432	
1283		1433	
1284		1434	
1285		1435	
1286		1436	
1287		1437	
1288	CI-CI-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-	1438	
1289		1439	
1290		1440	

1291		1441	
1292		1442	
1293		1443	
1294	F	1444	
1295		1445	
1296		1446	
1297		1447	
1298		1448	
1299		1449	
1300		1450	

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1301	F	1451	
1302		1452	
1303		1453	
1304		1454	
1305		1455	
1306		1456	Pr F P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
1307		1457	
1308		1458	
1309		1459	
1310		1460	

1311		1461	
1312		1462	
1313		1463	F F P N N N N N N N N N N N N N N N N N
1314		1464	F F N N N N N N N N N N N N N N N N N N
1315		1465	
1316		1466	
1317		1467	
1318		1468	
1319		1469	
1320	F	1470	F Pr

	Cl		
1321		1471	
1322	F + N - N - N - N - N - N - N - N - N - N	1472	
1323		1473	
1324		1474	
1325		1475	
1326		1476	
1327		1477	F - N - N - N - N - N - N - N - N - N -
1328		1478	
1329		1479	
1330		1480	

		
1331	1481	F-F-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V
1332	1482	
1333	1483	
1334	1484	
1335	1485	
1336	1486	
1337	1487	
1338	1488	
1339	1489	
1340	1490	

1341	1491	
1342	1492	
1343	1493	
1344	1494	
1345	1495	
1346	1496	
1347	1497	
1348	1498	
1349	1499	
1350	1500	

1501	1651	
1502	1652	S NO
1503	1653	
1504	1654	
1505	1655	
1506	1656	
1507	1657	
1508	1658	
1509	1659	
1510	1660	

1511		1661	
1512		1662	
1513		1663	
1514		1664	
1515		1665	
1516		1666	
1517		1667	
1518		1668	
1519		1669	
1520	P CI F F N N N N N N N N N N N N N N N N N N	1670	

		,	
1521	F F N N N N N N N N N N N N N N N N N N	1671	F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
1522		1672	
1523		1673	
1524		1674	
1525		1675	
1526		1676	
1527		1677	F COI
1528		1678	
1529		1679	F
1530		1680	

	C		
1531	F	1681	
1532		1682	
1533		1683	
1534		1684	
1535		1685	
1536		1686	
1537	F F N N N N N N N N N N N N N N N N N N	1687	
1538		1688	
1539		1689	
1540		1690	

	,		
1541		1691	
1542		1692	
1543		1693	
1544		1694	
1545		1695	
1546		1696	
1547		1697	
1548		1698	
1549		1699	
1550		1700	

1551	1701	
1552	1702	
1553	1703	
1554	1704	
1555	1705	
1556	1706	
1557	1707	
1558	1708	
1559	1709	
1560	1710	

1561	1711	F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
1562	1712	
1563	1713	
1564	1714	
1565	1715	F-F-S-1
1566	1716	
1567	1717	
1568	1718	
1569	1719	
1570	1720	

			
1571		1721	
1572		1722	
1573		1723	
1574	F	1724	
1575		1725	
1576		1726	
1577		1727	
1578		1728	
1579		1729	
1580		1730	

1581		1731	F F N N N N N N N N N N N N N N N N N N
1582		1732	
1583		1733	
1584		1734	
1585	F F N CI	1735	F P N B I
1586		1736	
1587		1737	F F N Br
1588	F F N Br	1738	F F N N N N N N N N N N N N N N N N N N
1589	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	1739	F F N N N N N N N N N N N N N N N N N N
1590		1740	

1591		1741	
1592		1742	
1593	F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	1743	
1594	FFF NON-ON-	1744	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1595		1745	F P N N N N N N N N N N N N N N N N N N
1596		1746	
1597		1 747	
1598		1748	
1599		1749	
1600		1750	

1601		1751	
1602		1752	- N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
1603	F-F-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N	1753	
1604		1754	
1605		1755	
1606		1756	
1607		1757	
1608		1758	
1609		1759	
1610	F	1760	

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1611		17 61	F F N CI
1612		1762	S NO
1613		1763	
1614		1764	
1615		1765	
1616		1766	Br F F N N N N N N N N N N N N N N N N N N
1617	PF P N N N N N N N N N N N N N N N N N N	1767	Br FF P
1618		1768	
1619		1769	
1620		1770	

			<u> </u>
1621		1771	
1622		1772	
1623		1773	
1624		1774	
1625		1775	
1626		1776	
1627	0	1777	
1628		1778	
1629		1779	
1630		1780	

1631	F	1781	
1632		1782	
1633		1783	
1634		1784	
1635		1785	
1636		1786	
1637		1787	
1638		1788	
1639		1789	
1640		1790	

1641	1791	
1642	1792	
1643	1793	
1644	1794	
1645	1795	F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
1646	1796	
1647	1797	
1648	1798	
1649	1799	
1650	1800	

1801	1951	
1802	1952	
1803	1953	
1804	1954	
1805	1955	
1806	1956	
1807	1957	
1808	1958	
1809	1959	
1810	1960	

1811		1961	
1812		1962	
1813		1963	
1814		1964	
1815		1965	
1816		1966	
1817		1967	
1818	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1968	
1819		1969	F-F-F
1820		1970	

1821		1971	
1822	FN-C1	1972	
1823		1973	
1824		1974	
1825		1975	
1826	N F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	1976	
1827		1977	
1828		1978	F F N Br
1829		1979	F F N N N N N N N N N N N N N N N N N N
1830		1980	

		,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1831	F-F-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N	1981	
1832		1982	
1833		1983	
1834		1984	
1835		1985	
1836		1986	F F N N N N N N N N N N N N N N N N N N
1837		1987	F F N N N N N N N N N N N N N N N N N N
1838		1988	
1839		1989	
1840	F H	1990	

			,
1841	F F N Br	1991	
1842	F-F-N-O-N-O-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-	1992	Pr P Pr N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
1843		1993	
1844		1994	
1845		1995	
1846		1996	F F N Br
1847		1997	
1848		1998	
1849		1999	
1850		2000	F N Pr

			,
1851	F	2001	
1852		2002	
1853		2003	
1854		2004	
1855		2005	
1856		2006	
1857		2007	
1858		2008	
1859		2009	
1860		2010	

	T	· · · · · · ·	
1861		2011	
1862		2012	
1863		2013	
1864		2014	
1865 _.		2015	
1866		2016	
1867		2017	
1868		2018	
1869		2019	
1870		2020	

) Rr	Т	
1871		2021	
1872	F-F	2022	FF-F
1873		2023	
1874		2024	
1875		2025	
1876		2026	
1877		2027	
1878		2028	
1879		2029	
1880		2030	

			~
1881		2031	
1882		2032	
1883		2033	
1884		2034	
1885		2035	
1886		2036	
1887		2037	
1888	F F N N N N N N N N N N N N N N N N N N	2038	
1889		2039	
1890	F F N N N N N N N N N N N N N N N N N N	2040	F F N N N N N N N N N N N N N N N N N N

	·	,	,
1891	F F N S N N N N N N N N N N N N N N N N	2041	P Pr P Pr N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
1892		2042	
1893		2043	
1894		2044	
1895		2045	
1896		2046	
1897		2047	
1898		2048	
1899		2049	
1900		2050	

	N SI		N Br
1901		2051	F TO NON
1902		2052	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
1903		2053	
1904		2054	
1905		2055	
1906	F F Pr	2056	
1907		2057	F N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
1908		2058	
1909	F P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	2059	F F N N N N N N N N N N N N N N N N N N
1910		2060	

	Dr.	-,	
1911		2061	
1912	F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-	2062	
1913	FFF FFF NON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-	2063	F P N N N N N N N N N N N N N N N N N N
1914	F - N - N - N - N - N - N - N - N - N -	2064	
1915		2065	
1916		2066	
1917		2067	
1918		2068	
1919	F	2069	
1920		2070	

1921	2071	P-FN-03-N-0-V-
1922	2072	
1923	2073	
1924	2074	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
1925	2075	
1926	2076	
1927	2077	
1928	2078	
1929	2079	
1930	2080	

1931	F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-	2081	
1932		2082	
1933		2083	
1934		2084	S NO
1935		2085	S NO
1936		2086	
1937		2087	
1938		2088	
1939		2089	F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
1940		2090	FFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

1941	2091	
1942	2092	F T N N N N N N N N N N N N N N N N N N
1943	2093	
1944	2094	
1945	2095	
1946	, 2096	
1947	2097	
1948	2098	
1949	2099	
1950	2100	

	. N Br	Τ	Rr
2101		2228	
2102		2229	
2103		2230	
2104	F-F-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N	2231	S NO
2105		2232	
2106		2233	
2107		2234	
2108		2235	
2109		2236	
2110		2237	

2111	2238	
2112	2239	
2113	2240	
2114	2241	
2115	2242	F Pr
2116	2243	
2117	2244	
2118	2245	
2119	2246	
2120	2247	

		,	· ·
2121		2248	
2122		2249	
2123		2250	
2124	F F F N N N N N N N N N N N N N N N N N	2251	
2125		2252	F-F-N-Br
2126		2253	
2127		2254	
2128	FFF F	2255	
2129	FF ON ON ON	2256	
2130		2257	

2131		2258	F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-
2132		2259	
2133	F - N - N - N - N - N - N - N - N - N -	2260	
2134		2261	
2135		2262	
2136		2263	
2137		2264	
2138		2265	
2139		2266	
2140		2267	

		т	
2141		2268	
2142		2269	F TO
2143		2270	
2144		2271	F-F-C
2145		2272	
2146	F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-	2273	
2147		2274	
2148		2275	F
2149		2276	F
2150		2277	

2151		2278	
2152	F	2279	
2153		2280	
2154		2281	F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-
2155		2282	F-F
2156		2283	F
2157		2284	
2158		2285	
2159		2286	F-F-F-N
2160		2287	FF C

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	,
2161		2288	
2162		2289	
2163		2290	
2164		2291	
2165		2292	
2166		2293	
2167		2294	S NO ON NO
2168	FN-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-	2295	S NO
2169		2296	- F
2170	F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-	2297	F N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2171		2298	
2172		2299	
2173		2300	
2174		2301	F P N N N N N N N N N N N N N N N N N N
2175		2302	
2176		2303	
2177		2304	
2178		2305	
2179		2306	
2180		2307	

2181		2308	
2182		2309	
2183		2310	
2184		2311	
2185		2312	
2186		2313	
2187	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	2314	
2188		2315	
2189		2316	
2190	F F N N N N N N N N N N N N N N N N N N	2317	

2191		2318	
2192		2319	
2193	FF C	2320	
2194		2321	
2195		2322	F-F-F
2196		2323	
2197		2324	
2198		2325	F TO NOT THE STATE OF THE STATE
2199		2326	
2200		2327	

Г	N, Br		N F F
2201		2328	
2202		2329	
2203		2330	
2204	F H N N N N N N N N N N N N N N N N N N	2331	
2205		2332	
2206		2333	
2207		2334	
2208		2335	
2209	F F N Pr	2336	
2210		2337	

		,	<u></u>
2211	FN-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-	2338	F Pr
2212	F-Br	2339	
2213		2340	
2214		2341	
2215	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	2342	
2216	P-P-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N	2343	
2217		2344	
2218	S NO ON NO	2345	
2219		2346	
2220		2347	F-F-F

2221	2348	
2222	2349	
2223	2350	
2224	2351	
2225	2352	
2226	2353	
2227		·

deren Tautomere, deren Diastereomere, deren Enantiomere, deren Hydrate, deren Gemische und deren Salze sowie die Hydrate der Salze, wobei den Verbindungen

- (1) 4-(2-Oxo-1,2-dihydro-imidazo[4,5-c]chinolin-3-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(R)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-[1,4']bipiperidinyl-1'-yl-2-oxo-ethylester,
- 0 (2) 4-(2-Oxo-1,2-dihydro-imidazo[4,5-c]chinolin-3-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(R)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-[4-(4-methyl-piperazin-1-yl)-piperidin-1-yl]-2-oxo-ethylester,

(3) 4-(2-Oxo-1,2-dihydro-imidazo[4,5-c]chinolin-3-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(R)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-[4-(1-methyl-piperidin-4-yl)-piperazin-1-yl]-2-oxo-ethylester,

5

- (4) 4-(2-Oxo-1,2-dihydro-imidazo[4,5-c]chinolin-3-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(R)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-(1'-methyl-[4,4']bipiperidinyl-1-yl)-2-oxo-ethylester,
- 0 (5) 4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-[4-(4-methyl-piperazin-1-yl)-piperidin-1-yl]-2-oxo-ethylester,
- (6) 4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure (R)1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-[4-(1-methyl-piperidin-4-yl)piperazin-1-yl]-2-oxo-ethylester,
- (7) 4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(R)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-(1'-methyl-[4,4']bipiperidinyl-1-yl)-2-oxo-ethylester,
 - (8) 4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-[1,4']bipiperidinyl-1'-yl-2-oxo-ethylester,

:5

- (9) 4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-[4-(1-aza-bicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-piperazin-1-yl]-2-oxo-ethylester,
- deren Tautomeren, deren Diastereomeren, deren Enantiomeren, deren Hydraten, deren Gemischen und deren Salzen sowie den Hydraten der Salze eine herausragende Bedeutung zukommt.

5

0

5

Die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) werden nach prinzipiell bekannten Methoden hergestellt. Die folgenden Verfahren haben sich zur Herstellung der erfindungsgemäßen Verbindungen der allgemeinen Formel (I) besonders bewährt:

(a) Zur Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel

$$\mathbb{R}^1$$
 \mathbb{R}^2
 \mathbb{R}^3
 \mathbb{R}^3

in der X das Sauerstoffatom oder die NH-Gruppe bedeutet und A und R¹ bis R³ wie eingangs erwähnt definiert sind:

Umsetzung eines Piperidins der allgemeinen Formel

in der R¹ wie eingangs erwähnt definiert ist,

(i) mit einem Kohlensäurederivat der allgemeinen Formel

$$G G G$$
, (IV)

in der G eine nucleofuge Gruppe, die gleich oder verschieden sein kann, bevorzugt die Phenoxy-, 1*H*-Imidazol-1-yl-, 1*H*-1,2,4-Triazol-1-yl-, Trichlormethoxy- oder die 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yloxy-Gruppe, bedeutet, mit der Maßgabe, dass X die NH-Gruppe darstellt, oder

(ii) mit einem Kohlensäurederivat der allgemeinen Formel

10

15

20

25

in der G eine nucleofuge Gruppe, die gleich oder verschieden sein kann, bevorzugt das Chloratom, die *p*-Nitrophenoxy- oder Trichlormethoxy-Gruppe, bedeutet, mit der Maßgabe, dass X das Sauerstoffatom bedeutet,

und mit einer Verbindung der allgemeinen Formel

in der X das Sauerstoffatom oder eine NH-Gruppe bedeutet und A, R² und R³ wie eingangs erwähnt definiert sind, mit der Maßgabe, dass R² und R³ keine weitere freie primäre oder sekundäre aliphatische Aminofunktion enthalten.

Eine gegebenenfalls in dem Rest –NR²R³ zusätzlich vorhandene primäre oder sekundäre Aminofunktion wird jeweils mit einer geeigneten Schutzgruppe versehen.

Die im Prinzip zweistufigen Reaktionen werden in der Regel als Eintopfverfahren durchgeführt, und zwar bevorzugt in der Weise, dass man in der ersten Stufe eine der beiden Komponenten (III) oder (V) mit äquimolaren Mengen des Kohlensäurederivates der allgemeinen Formel (IV) in einem geeigneten Lösemittel bei tieferer Temperatur zur Reaktion bringt, anschließend wenigstens äquimolare Mengen der anderen Komponente (III) oder (V) zugibt und die Umsetzung bei höherer Temperatur beendet. Die Umsetzungen mit Bis-(trichlormethyl)-carbonat werden bevorzugt in Gegenwart von wenigstens 2 Äquivalenten (bezogen auf Bis-(trichlormethyl)-carbonat) einer tertiären Base, beispielsweise von Triethylamin, N-Ethyldiisopropylamin, Pyridin, 1,5-Diaza-bicyclo-[4.3.0]-non-5-en, 1,4-Diazabicyclo-[2.2.2]octan oder 1,8-Diazabicyclo-[5.4.0]-un-dec-7-en, durchgeführt. Als Lösungsmittel, die wasserfrei sein sollten, kommen beispielsweise Tetrahydrofuran, Dioxan,

Dimethylformamid, Dimethylacetamid, N-Methyl-2-pyrrolidon, 1.3-Dimethyl-2imidazolidinon oder Acetonitril in Betracht, bei Verwendung von Bis-(trichlormethyl)carbonat als Carbonylkomponente werden wasserfreie Chlorkohlenwasserstoffe, beispielsweise Dichlormethan, 1,2-Dichlorethan oder Trichlorethylen, bevorzugt. Die Reaktionstemperaturen liegen für die erste Reaktionsstufe zwischen -30°C und +25°C, bevorzugt -5°C und +10°C, für die zweite Reaktionsstufe zwischen +15°C und der Siedetemperatur des verwendeten Lösemittels, bevorzugt zwischen +20°C und +70°C (Siehe auch: H. A. Staab und W. Rohr, "Synthesen mit heterocyclischen Amiden (Azoliden)", Neuere Methoden der Präparativen Organischen Chemie, Band V, S. 53-93, Verlag Chemie, Weinheim/Bergstr., 1967; P. Majer und R.S. Randad, J. Org. Chem. 59, S. 1937-1938 (1994); K. Takeda, Y. Akagi, A. Saiki, T. Sukahara und H. Ogura, Tetrahedron Letters 24 (42), 4569-4572 (1983); S.R. Sandler und W. Karo in "Organic Functional Group Preparations", Vol. II, S. 223-245, Academis Press, New York 1971).

(b) Zur Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel

5

10

15

20

25

$$\mathbb{R}^1$$
 \mathbb{R}^2
 \mathbb{R}^3
 \mathbb{R}^3

in der X die Methylengruppe bedeutet und A und R¹ bis R³ wie eingangs erwähnt definiert sind, mit der Maßgabe, dass keine weitere freie primäre oder sekundäre aliphatische Aminofunktion im Molekül enthalten ist:

Kupplung einer Carbonsäure der allgemeinen Formel

HO
$$R^2$$
 $N R^3$
 O
, (VI)

in der A, R^2 und R^3 wie eingangs erwähnt definiert sind, mit einem Piperidin der allgemeinen Formel

in der R¹ die eingangs erwähnten Bedeutungen besitzt.

5

0

5

0!

Die Kupplung wird bevorzugt unter Verwendung von aus der Peptidchemie bekannten Verfahren (siehe z. B. Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, Bd. 15/2) durchgeführt, wobei zum Beispiel Carbodiimide, wie z.B. Dicyclohexylcarbodiimid (DCC), Diisopropylcarbodiimid (DIC) oder Ethyl-(3-dimethylamino-O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N-N',N'-tetramethyluronium-hexapropyl)-carbodiimid. fluorphosphat (HBTU) oder -tetrafluorborat (TBTU) oder 1H-Benzotriazol-1-yl-oxytris-(dimethylamino)-phosphoniumhexafluorphosphat (BOP) eingesetzt werden. Durch Zugabe von 1-Hydroxybenzotriazol (HOBt) oder von 3-Hydroxy-4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin (HOOBt) kann die Reaktionsgeschwindigkeit gesteigert werden. Die Kupplungen werden normalerweise mit äquimolaren Anteilen der Kupplungskomponenten sowie des Kupplungsreagenz in Lösemitteln wie Dichlormethan, Tetrahydrofuran, Acetonitril, Dimethylformamid (DMF), Dimethylacetamid (DMA), N-Methylpyrrolidon (NMP) oder Gemischen aus diesen und bei Temperaturen zwischen -30°C und +30°C, bevorzugt -20°C und +25°C, durchgeführt. Sofern erforderlich, wird als zusätzliche Hilfsbase N-Ethyldiisopropylamin (DIEA) (Hünig-Base) bevorzugt.

Als weiteres Kupplungsverfahren zur Synthese von Verbindungen der allgemeinen Formel (I) wird das sogenannte "Anhydridverfahren" (siehe auch: M. Bodanszky, "Peptide Chemistry", Springer-Verlag 1988, S. 58-59; M. Bodanszky, "Principles of Peptide Synthesis", Springer-Verlag 1984, S. 21-27) eingesetzt. Bevorzugt wird das "gemischte Anhydridverfahren" in der Variante nach Vaughan (J.R. Vaughan Jr., J. Amer. Chem.Soc. 73, 3547 (1951)), bei der unter Verwendung von Chlorkohlensäureisobutylester in Gegenwart von Basen, wie 4-Methylmorpholin oder 4-Ethylmorpholin, das gemischte Anhydrid aus der zu kuppelnden Carbonsäure der

allgemeinen Formel (VI) und dem Kohlensäure-monoisobutylester erhalten wird. Die Herstellung dieses gemischten Anhydrids und die Kupplung mit Aminen erfolgt im Eintopfverfahren, unter Verwendung der vorstehend genannten Lösemittel und bei Temperaturen zwischen -20 und +25°C, bevorzugt 0°C und +25°C.

5

Zur Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel (c)

$$\mathbb{R}^{1}$$
 \mathbb{R}^{1}
 \mathbb{R}^{1}
 \mathbb{R}^{2}
 \mathbb{R}^{3}
 \mathbb{R}^{3}

10

in der X die Methylengruppe bedeutet und A und R² und R³ wie eingangs erwähnt definiert sind, mit der Maßgabe, dass diese Gruppen kein freies primäres oder sekundäres Amin enthalten:

Kupplung einer Verbindung der allgemeinen Formel

15

30

25

Nu
$$R^3$$
 , (VII)

in der A. R² und R³ wie eingangs erwähnt definiert sind, mit der Maßgabe, dass R² und R³ kein freies primäres oder sekundäres Amin enthalten, und Nu eine Austrittsgruppe, beispielsweise ein Halogenatom, wie das Chlor-, Brom- oder lodatom, eine Alkylsulfonyloxygruppe mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen im Alkylteil, eine gegebenenfalls durch Chlor- oder Bromatome, durch Methyl- oder Nitrogruppen mono-, di- oder trisubstituierte Phenylsulfonyloxy- oder Naphthylsulfonyloxygruppe, wobei die Substituenten gleich oder verschieden sein können, eine 1H-Imidazol-1-yl-, eine gegebenenfalls durch eine oder zwei Methylgruppen im Kohlenstoffgerüst substituierte 1H-Pyrazol-1-yl-, eine 1H-1,2,4-Triazol-1-yl-, 1H-1,2,3-Triazol-1-yl-, 1H-

1,2,3,4-Tetrazol-1-yl-, eine Vinyl-, Propargyl-, *p*-Nitrophenyl-, 2,4-Dinitrophenyl-, Trichlorphenyl-, Pentachlorphenyl-, Pentafluorphenyl-, Pyranŷl- oder Pyridinyl-, eine Dimethylaminyloxy-, 2(1*H*)-Oxopyridin-1-yl-oxy-, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yloxy-, Phthalimidyloxy-, 1*H*-Benzo-triazol-1-yloxy- oder Azidgruppe bedeutet,

5

15

20

25

mit einem Piperidin der allgemeinen Formel

in der R¹ wie eingangs erwähnt definiert ist.

Die Umsetzung wird unter Schotten-Baumann- oder Einhorn-Bedingungen durchgeführt, das heißt die Komponenten werden in Gegenwart von wenigstens einem Äquivalent einer Hilfsbase bei Temperaturen zwischen -50°C und +120°C, bevorzugt -10°C und +30°C, und gegebenenfalls in Gegenwart von Lösemitteln zur Reaktion gebracht. Als Hilfsbasen kommen bevorzugt Alkali- und Erdalkalihydroxide, beispielsweise Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid oder Bariumhydroxid, Alkalicarbonate, z. B. Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat oder Cäsiumcarbonat, Alkaliacetate, z.B. Natrium- oder Kaliumacetat, sowie tertiäre Amine, beispielsweise Pyridin, 2,4,6-Tri-methylpyridin, Chinolin, Triethylamin, N-Ethyl-diisopropylamin, N-Ethyl-dicyclohexyl-amin, 1,4-Di-azabicyclo[2.2.2]octan oder 1,8-Diazabicyclo-[5.4.0]-undec-7-en, als Lösemittel beispielsweise Dichlormethan, Tetrahydrofuran, 1.4-Dioxan, Acetonitril, Dimethylformamid, Dimethylacetamid, N-Methylpyrrolidon oder Gemische davon in Betracht; werden als Hilfsbasen Alkali- oder Erdalkalihydroxide. Alkalicarbonate oder -acetate verwendet, kann dem Reaktionsgemisch auch Wasser als Cosolvens zugesetzt werden.

(d) Zur Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel

5

30

25

$$\mathbb{R}^1$$
 \mathbb{R}^2
 \mathbb{R}^3
 \mathbb{R}^3

in der A, X und R¹ bis R³ wie eingangs erwähnt definiert sind:

5 Kupplung einer Carbonsäure der allgemeinen Formel

in der A, X und R¹ wie eingangs erwähnt definiert sind, mit einem Amin der allgemeinen Formel HNR²R³, in der R² und R³ wie eingangs definiert sind, mit der Maßgabe, dass sie keine weitere freie primäre oder sekundäre aliphatische Aminofunktion enthalten.

Die Kupplung wird bevorzugt unter Verwendung von aus der Peptidchemie bekannten Verfahren (siehe z. B. Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, Band 15/2) durchgeführt, wobei zum Beispiel Carbodiimide, wie z.B. Dicyclohexylcarbodiimid (DCC), Diisopropylcarbodiimid (DIC) oder Ethyl-(3-dimethylamino-propyl)-carbodiimid, O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N-N',N'-tetramethyluronium-hexafluorphosphat (HBTU) oder -tetrafluorborat (TBTU) oder 1H-Benzotriazol-1-yl-oxy-tris-(dimethylamino)-phosphoniumhexafluorphosphat (BOP) eingesetzt werden. Durch Zugabe von 1-Hydroxybenzotriazol (HOBt) oder von 3-Hydroxy-4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin (HOOBt) kann die Reaktionsgeschwindigkeit gesteigert werden. Die Kupplungen werden normalerweise mit äquimolaren Anteilen der Kupplungskomponenten sowie des Kupplungsreagenz in Lösungsmitteln wie Dichlormethan, Tetrahydrofuran, Acetonitril, Dimethylformamid (DMF), Dimethylacetamid (DMA), N-Methylpyrrolidon (NMP) oder Gemischen aus diesen und bei Temperaturen

zwischen -30 und +30°C, bevorzugt -20 und +25°C, durchgeführt. Sofern erforderlich wird als zusätzliche Hilfsbase *N*-Ethyldiisopropylamin (DIEA) (Hünig-Base) bevorzugt.

PCT/EP2005/003759

Als weiteres Kupplungsverfahren zur Synthese von Verbindungen der allgemeinen 5 Formel (I) wird das sogenannte "Anhydridverfahren" (siehe auch: M. Bodanszky, "Peptide Chemistry", Springer-Verlag 1988, S. 58-59; M. Bodanszky, "Principles of Peptide Synthesis", Springer-Verlag 1984, S. 21-27) eingesetzt. Bevorzugt wird das "gemischte Anhydridverfahren" in der Variante nach Vaughan (J.R. Vaughan Jr., J. Amer. Chem.Soc. 73, 3547 (1951)), bei der unter Verwendung von Chlorkohlensäu-0 reisobutylester in Gegenwart von Basen, wie 4-Methylmorpholin oder 4-Ethylmorpholin, das gemischte Anhydrid aus der zu kuppelnden Carbonsäure der allgemeinen Formel (VIII) und dem Kohlensäuremonoisobutylester erhalten wird. Die Herstellung dieses gemischten Anhydrids und die Kupplung mit den Aminen der allgemeinen Formel HNR²R³ erfolgt im Eintopfverfahren, unter Verwendung der vorstehend 5 genannten Lösemittel und bei Temperaturen zwischen -20°C und +25°C, bevorzugt zwischen 0°C und +25°C.

(e) Zur Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel

 \mathbb{R}^{1} \mathbb{R}^{1} \mathbb{R}^{1} \mathbb{R}^{2} \mathbb{R}^{3} \mathbb{R}^{3}

in der A, X und R^1 bis R^3 wie eingangs erwähnt definiert sind, mit der Maßgabe, dass kein freies primäres oder sekundäres Amin im Molekül enthalten ist:

Kupplung einer Verbindung der allgemeinen Formel

:0

25

$$\mathbb{R}^1$$
 \mathbb{N} \mathbb{N} \mathbb{N} \mathbb{N} \mathbb{N} \mathbb{N} \mathbb{N} \mathbb{N} \mathbb{N}

in der A, X und R¹ wie eingangs erwähnt definiert sind und Nu eine Austrittsgruppe, beispielsweise ein Halogenatom, wie das Chlor-, Brom- oder lodatom, eine Alkylsulfonyloxygruppe mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen im Alkylteil, eine gegebenenfalls durch Chlor- oder Bromatome, durch Methyl- oder Nitrogruppen mono-, di- oder trisubstituierte Phenylsulfonyloxy- oder Naphthylsulfonyloxygruppe, wobei die Substituenten gleich oder verschieden sein können, eine 1*H*-Imidazol-1-yl-, eine gegebenenfalls durch eine oder zwei Methylgruppen im Kohlenstoffgerüst substituierte 1*H*-Pyrazol-1-yl-, eine 1*H*-1,2,4-Triazol-1-yl-, 1*H*-1,2,3-Triazol-1-yl-, eine Vinyl-, Propargyl-, *p*-Nitrophenyl-, 2,4-Dinitrophenyl-, Trichlorphenyl-, Pentachlorphenyl-, Pentafluorphenyl-, Pyranyl- oder Pyridinyl-, eine Dimethylaminyloxy-, 2(1*H*)-Oxopyridin-1-yl-oxy-, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yloxy-, Phthalimidyloxy-, 1*H*-Benzo-triazol-1-yloxy- oder Azidgruppe bedeutet,

5

10

15

20

25

30

mit einem Amin der allgemeinen Formel HNR²R³, in der R² und R³ wie eingangs definiert sind, mit der Maßgabe, dass keine freie Carbonsäure- und/oder keine weitere freie primäre oder sekundäre aliphatische Aminofunktion enthalten ist.

Die Umsetzung wird unter Schotten-Baumann- oder Einhorn-Bedingungen durchgeführt, das heißt, die Komponenten werden in Gegenwart von wenigstens einem Äquivalent einer Hilfsbase bei Temperaturen zwischen -50°C und +120°C, bevorzugt -10°C und +30°C, und gegebenenfalls in Gegenwart von Lösungsmitteln zur Reaktion gebracht. Als Hilfsbasen kommen bevorzugt Alkali- und Erdalkalihydroxide, beispielsweise Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid oder Bariumhydroxid, Alkalicarbonate, z. B. Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat oder Cäsiumcarbonat, Alkaliacetate, z.B. Natrium- oder Kaliumacetat, sowie tertiäre Amine, beispielsweise Pyridin, 2,4,6-Trimethylpyridin, Chinolin, Triethylamin, *N*-Ethyldiisopropylamin, *N*-Ethyldicyclohexylamin, 1,4-Di-azabicyclo[2.2.2]octan oder 1,8-Diaza-bicyclo[5.4.0]-undec-7-en, als Lösungsmittel beispielsweise Dichlormethan, Tetrahydrofuran,

WO 2005/100352 PCT/EP2005/003759

1,4-Dioxan, Acetonitril, Dimethylformamid, Dimethylacetamid, *N*-Methylpyrrolidon oder Gemische davon in Betracht; werden als Hilfsbasen Alkali- oder Erdalkali-hydroxide, Alkalicarbonate oder -acetate verwendet, kann dem Reaktionsgemisch auch Wasser als Cosolvens zugesetzt werden.

5

10

15

20

25

30

Die erfindungsgemäßen neuen Verbindungen der allgemeinen Formel (I) enthalten ein oder mehrere Chiralitätszentren. Sind beispielsweise zwei Chiralitätszentren vorhanden, dann können die Verbindungen in Form zweier diastereomerer Antipodenpaare auftreten. Die Erfindung umfaßt die einzelnen Isomeren ebenso wie ihre Gemische.

Die Trennung der jeweiligen Diastereomeren gelingt auf Grund ihrer unterschiedlichen physikochemischen Eigenschaften, z.B. durch fraktionierte Kristallisation aus geeigneten Lösemitteln, durch Hochdruckflüssigkeits- oder Säulenchromatographie unter Verwendung chiraler oder bevorzugt achiraler stationärer Phasen.

Die Trennung von unter die allgemeine Formel (I) fallenden Racematen gelingt beispielsweise durch HPLC an geeigneten chiralen stationären Phasen (z. B. Chiral AGP, Chiralpak AD). Racemate, die eine basische Funktion enthalten, lassen sich auch über die diastereomeren, optisch aktiven Salze trennen, die bei Umsetzung mit einer optisch aktiven Säure, beispielsweise (+)- oder (-)-Weinsäure, (+)- oder (-)-Diacetylweinsäure, (+)- oder (-)-Monomethyltartrat oder (+)-Camphersulfonsäure entstehen.

Nach einem üblichen Verfahren zur Isomerentrennung wird das Racemat einer Verbindung der allgemeinen Formel (I) mit einer der vorstehend angegebenen optisch aktiven Säuren in äquimolarer Menge in einem Lösemittel umgesetzt und die erhaltenen kristallinen, diastereomeren, optisch aktiven Salze unter Ausnutzung ihrer verschiedenen Löslichkeit getrennt. Diese Umsetzung kann in jeder Art von Lösemitteln durchgeführt werden, solange sie einen ausreichenden Unterschied hinsichtlich der Löslichkeit der Salze aufweisen. Vorzugsweise werden Methanol, Ethanol oder deren Gemische, beispielsweise im Volumenverhältnis 50:50, verwendet. Sodann wird jedes der optisch aktiven Salze in Wasser gelöst, mit einer

Base, wie Natriumcarbonat oder Kaliumcarbonat, oder mit einer geeigneten Säure, beispielsweise mit verdünnter Salzsäure oder wässeriger Methansulfonsäure, vorsichtig neutralisiert und dadurch die entsprechende freie Verbindung in der (+)-oder (-)-Form erhalten.

5

Jeweils nur das (R)- oder (S)-Enantiomer bzw. ein Gemisch zweier optisch aktiver, unter die allgemeine Formel (I) fallender diastereomerer Verbindungen wird auch dadurch erhalten, dass man die oben beschriebenen Synthesen mit jeweils einer geeigneten (R)- bzw. (S)-konfigurierten Reaktionskomponente durchführt.

0

5

0

5

0

werden.

Die Ausgangsverbindungen der allgemeinen Formel (III) erhält man, soweit sie nicht literaturbekannt oder gar käuflich sind, entsprechend den in der internationalen Patentanmeldung WO 98/11128 und DE 199 52 146 angegebenen Verfahren. Die Ausgangsverbindungen der allgemeinen Formel (IV) sind käuflich. Verbindungen der allgemeinen Formel (V) lassen sich nach dem Peptidchemiker geläufigen Methoden aus geschützten Phenylalaninen und Aminen der allgemeinen Formel HNR²R³ herstellen.

Die zur Herstellung der optisch reinen Verbindungen der allgemeinen Formel (V) nötigen Phenyalaninderivate können aus den Verbindungen der allgemeinen Formel

in der A wie eingangs erwähnt definiert ist und R eine unverzweigte Alkylgruppe, bevorzugt die Methyl- oder Ethylgruppe, darstellt, durch Racematspaltung hergestellt

Diese Racematspaltung kann mit Hilfe enzymatischer Methoden durchgeführt werden, wobei nur ein Enantiomer des Racemates transformiert wird und das entstehende Gemisch dann mit Hilfe physikochemischer Methoden, bevorzugt mit

Hilfe chromatographischer Methoden, getrennt wird. Ein geeignetes Enzymsystem für diesen Schritt stellt das Enzym Alcalase 2.4 L FG (Novozymes A/S; DK 2880 Bagsvaerd) dar. Die Verbindungen der allgemeinen Formel (X) können dann mit für Peptidchemiker geläufigen Methoden in die enantiomerenreinen Verbindungen der allgemeinen Formel (V) überführt werden.

5

0

5

0.

Falls die Gruppe X in Verbindungen der allgemeinen Formel (V) das Sauerstoffatom darstellt, können die für die Synthese benötigten Hydroxycarbonsäuren der allgemeinen Formel

in der A wie eingangs erwähnt definiert ist, aus Verbindungen der allgemeinen Formel (X) gewonnen werden, mit der Maßgabe, dass R das Wasserstoffatom darstellt.

Unter der Maßgabe, dass der Rest A keine Amino- oder Methylaminogruppe enthält, können durch Diazotierung von Verbindungen der allgemeinen Formel (X) mit einem geeigneten Diazotierungsreagenz, bevorzugt Natriumnitrit in saurem Milieu, die Verbindungen der allgemeinen Formel (XI) erhalten werden. Bei Einsatz enantiomerenreiner Verbindungen werden die entsprechenden enantiomerenreinen Hydroxycarbonsäureverbindungen erhalten, wobei die Reaktion unter Retention der Konfiguration abläuft.

Ein weiterer Zugang zu Verbindungen der allgemeinen Formel (XI), in der die Reste A wie eingangs erwähnt definiert sind, besteht in der Alkylierung der Verbindung

5

0

5

0.

mit entsprechend substituierten Benzylchloriden, Benzylbromiden oder Benzyliodiden der allgemeinen Formel

in der A wie eingangs erwähnt definiert ist und X ein Chlor-, Brom- oder Jodatom bedeutet, in Analogie zu literaturbekannten Methoden (Michael T. Crimmins, Kyle A. Emmitte und Jason D. Katz, Org. Lett. 2, 2165-2167 [2000]).

Die entstehenden diastereomeren Produkte können dann mit Hilfe physikochemischer Methoden, bevorzugt mit Hilfe chromatographischer Methoden, getrennt werden. Die hydrolytische Abspaltung des chiralen Auxiliars, Kupplung mit Aminen der allgemeinen Formel HNR²R³ und Abspaltung der Benzylschutzgruppe eröffnet ebenfalls einen Zugang zu enantiomerenreinen Hydroxycarbonsäureverbindungen des allgemeinen Formel (V).

Verbindungen der allgemeinen Formel (XI), in der die Reste A wie eingangs erwähnt definiert sind, können weiterhin durch Verkochen von 2-Acetylamino-3-phenylacrylsäuren der allgemeinen Formel

mittels starker Säuren und anschließender Reduktion der entstandenen 2-Hydroxy-3phenyl-acrylsäuren erhalten werden.

5

5

0

5

10

Die Ausgangsverbindungen der allgemeinen Formel (VI) erhält man beispielsweise durch Umsetzung von Aminen der allgemeinen Formel HNR²R³ mit 2-(Alkoxycarbonylmethyl)-3-aryl-propansäuren und anschließende hydrolytische Abspaltung der Alkylgruppe. Die erforderlichen 2-(Alkoxycarbonylmethyl)-3-aryl-propansäuren können in Analogie zu literaturbekannten Methoden (David A. Evans, Leester D. Wu, John J. M. Wiener, Jeffrey S. Johnson, David H. B. Ripin und Jason S. Tedrow, J. Org.Chem 64, 6411-6417 [1999]; Saul G. Cohen und Aleksander Milovanovic, J. Am. Chem. Soc. 90, 3495-3502 [1968]; Hiroyuki Kawano, Youichi Ishii, Takao Ikariya, Masahiko Saburi, Sadao Yoshikawa, Yasuzo Uchida und Hidenori Kumobayashi, Tetrahedron Letters 28, 1905-1908 [1987]) hergestellt werden. Carbonsäuren der allgemeinen Formel (VIII) können nach den in der WO 98/11128 angegebenen Verfahren aus allgemein zugänglichen Ausgangsmaterialien hergestellt werden.

Die erhaltenen Verbindungen der allgemeinen Formel (I) können, sofern sie geeignete basische Funktionen enthalten, insbesondere für pharmazeutische Anwendungen in ihre physiologisch verträglichen Salze mit anorganischen oder organischen Säuren übergeführt werden. Als Säuren kommen hierfür beispielsweise Salzsäure, Bromwasserstoffsäure, Phosphorsäure, Salpetersäure, Schwefelsäure, Methansulfonsäure, Ethansulfonsäure, Benzolsulfonsäure, p-Toluolsulfonsäure, Essigsäure, Fumarsäure, Bernsteinsäure, Milchsäure, Mandelsäure, Äpfelsäure, Zitronensäure, Weinsäure oder Maleinsäure in Betracht.

Die vorliegende Erfindung betrifft Racemate, sofern die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) nur ein Chiralitätselement besitzen. Die Anmeldung umfasst iedoch auch die einzelnen diastereomeren Antipodenpaare oder deren Gemische, die dann vorliegen, wenn mehr als ein Chiralitätselement in den Verbindungen der allgemeinen Formel (I) vorhanden ist, sowie die einzelnen optisch aktiven Enantiomeren, aus denen sich die erwähnten Racemate zusammensetzen.

- 5 Ebenfalls mit vom Gegenstand dieser Erfindung umfasst sind die erfindungsgemäßen Verbindungen, einschließlich deren Salze, in denen ein oder mehrere Wasserstoffatome durch Deuterium ausgetauscht sind.
- Die neuen Verbindungen der allgemeinen Formel (I) und deren physiologisch verträgliche Salze weisen wertvolle pharmakologische Eigenschaften auf, die auf ihre selektiven CGRP-antagonistischen Eigenschaften zurückgehen. Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind diese Verbindungen enthaltende Arzneimittel, deren Verwendung und deren Herstellung.
- Die voranstehend genannten neuen Verbindungen und deren physiologisch verträgliche Salze besitzen CGRP-antagonistische Eigenschaften und zeigen gute Affinitäten in CGRP-Rezeptorbindungsstudien. Die Verbindungen weisen in den nachstehend beschriebenen pharmakologischen Testsystemen CGRP-antagonistische Eigenschaften auf.

:0

:5

30

Zum Nachweis der Affinität der voranstehend genannten Verbindungen zu humanen CGRP-Rezeptoren und ihrer antagonistischen Eigenschaften wurden die folgenden Versuche durchgeführt:

A. Bindungsstudien mit (den humanen CGRP-Rezeptor exprimierenden) SK-N-MC-Zellen

SK-N-MC-Zellen werden in "Dulbecco's modified Eagle Medium" kultiviert. Das Medium konfluenter Kulturen wird entfernt. Die Zellen werden zweimal mit PBS-Puffer (Gibco 041-04190 M) gewaschen, durch Zugabe von PBS-Puffer, versetzt mit 0.02% EDTA, abgelöst und durch Zentrifugation isoliert. Nach Resuspension in 20 ml "Balanced Salts Solution" [BSS (in mM): NaCl 120, KCl 5.4, NaHCO₃ 16.2, MgSO₄ 0.8, NaHPO₄ 1.0, CaCl₂ 1.8, D-Glucose 5.5, HEPES 30, pH 7.40] werden die Zellen

zweimal bei 100 x g zentrifugiert und in BSS resuspendiert. Nach Bestimmung der Zellzahl werden die Zellen mit Hilfe eines Ultra-Turrax homogenisiert und für 10 Minuten bei 3000 x g zentrifugiert. Der Überstand wird verworfen und das Pellet in Tris-Puffer (10 mM Tris, 50 mM NaCl, 5 mM MgCl₂, 1 mM EDTA, pH 7.40), angereichert mit 1% Rinderserum-Albumin und 0.1% Bacitracin, rezentrifugiert und resuspendiert (1 ml / 1000000 Zellen). Das Homogenat wird bei -80°C eingefroren. Die Membranpräparationen sind bei diesen Bedingungen für mehr als 6 Wochen stabil.

Nach Auftauen wird das Homogenat 1:10 mit Assay-Puffer (50 mM Tris, 150 mM NaCl, 5 mM MgCl₂, 1 mM EDTA, pH 7.40) verdünnt und 30 Sekunden lang mit einem Ultra-Turrax homogenisiert. 230 μl des Homogenats werden für 180 Minuten bei Raumtemperatur mit 50 pM ¹²⁵l-lodotyrosyl-Calcitonin-Gene-Related Peptide (Amersham) und ansteigenden Konzentrationen der Testsubstanzen in einem Gesamtvolumen von 250 μl inkubiert. Die Inkubation wird durch rasche Filtration durch mit Polyethylenimin (0.1%) behandelte GF/B-Glasfaserfilter mittels eines Zellharvesters beendet. Die an Protein gebundene Radioaktivität wird mit Hilfe eines Gammacounters bestimmt. Als nichtspezifische Bindung wird die gebundene Radioaktivität nach Gegenwart von 1 μM humanem CGRP-alpha während der Inkubation definiert.

Die Analyse der Konzentrations-Bindungskurven erfolgt mit Hilfe einer computergestützten nichtlinearen Kurvenanpassung.

5 Die eingangs erwähnten Verbindungen zeigen in dem beschriebenen Test IC₅₀-Werte ≤ 10000 nM.

B. CGRP-Antagonismus in SK-N-MC-Zellen

5

0 SK-N-MC-Zellen (1 Mio. Zellen) werden zweimal mit 250 μl Inkubationspuffer (Hanks' HEPES, 1 mM 3-Isobutyl-1-methylxanthin, 1% BSA, pH 7.4) gewaschen und bei 37°C für 15 Minuten vorinkubiert. Nach Zugabe von CGRP (10 μl) als Agonist in steigenden Konzentrationen (10⁻¹¹ bis 10⁻⁶ M) bzw. zusätzlich von Substanz in 3 bis

PCT/EP2005/003759

4 verschiedenen Konzentrationen wird nochmals 15 Minuten inkubiert.

Intrazelluläres cAMP wird anschließend durch Zugabe von 20 µl 1M HCl und Zentrifugation (2000 x g, 4°C für 15 Minuten) extrahiert. Die Überstände werden in flüssigem Stickstoff eingefroren und bei –20°C gelagert.

Die cAMP-Gehalte der Proben werden mittels Radioimmunassay (Fa. Amersham) bestimmt und die pA₂-Werte antagonistisch wirkender Substanzen graphisch ermittelt.

0

5

Die erfindungsgemäßen Verbindungen zeigen in dem beschriebenen *in vitro* Testmodell CGRP-antagonistische Eigenschaften in einem Dosisbereich zwischen 10^{-12} bis 10^{-5} M.

- 5 Aufgrund ihrer pharmakologischen Eigenschaften eignen sich die erfindungsgemäßen Verbindungen und deren Salze mit physiologisch verträglichen Säuren somit zur akuten und prophylaktischen Behandlung von Kopfschmerzen, insbesondere Migräne- bzw. Cluster-Kopfschmerz. Weiterhin beeinflussen die erfindungsgemäßen Verbindungen auch die folgenden Erkrankungen positiv:
- Nicht-insulinabhängigen Diabetes mellitus ("NIDDM"), complex regional pain syndrome (CRPS1), cardiovaskuläre Erkrankungen, Morphintoleranz, Clostritiumtoxin-bedingte Durchfallerkrankungen, Erkrankungen der Haut, insbesondere thermische und strahlenbedingte Hautschäden inklusive Sonnenbrand, entzündliche Erkrankungen, z.B. entzündliche Gelenkerkrankungen (Arthritis), neurogene Entzündungen der oralen Mucosa, entzündliche Lungenerkrankungen, allergische Rhinitis, Asthma, Erkrankungen, die mit einer überschießenden Gefäßerweiterung und dadurch bedingter verringerter Gewebedurchblutung einhergehen, z.B. Schock und Sepsis. Darüber hinaus zeigen die erfindungsgemäßen Verbindungen eine lindernde Wirkung auf Schmerzzustände im allgemeinen.
- Die Symptomatik menopausaler, durch Gefäßerweiterung und erhöhten Blutfluß verursachter Hitzewallungen östrogendefizienter Frauen sowie hormonbehandelter Prostatakarzinompatienten wird durch die CGRP-Antagonisten der vorliegenden Anwendung präventiv und akut-therapeutisch günstig beeinflußt, wobei sich dieser

Therapieansatz vor der Hormonsubstitution durch Nebenwirkungsarmut auszeichnet.

Die zur Erzielung einer entsprechenden Wirkung erforderliche Dosierung beträgt zweckmäßigerweise bei intravenöser oder subkutaner Gabe 0.01 bis 3 mg/kg Körpergewicht, vorzugsweise 0.01 bis 1 mg/kg Körpergewicht, bei oraler Gabe 0.01 bis 20 mg/kg Körpergewicht, vorzugsweise 0.1 bis 10 mg/kg Körpergewicht, und bei nasaler oder inhalativer Gabe 0.01 bis 10 mg/kg Körpergewicht, vorzugsweise 0.1 bis 10 mg/kg Körpergewicht, jeweils 1 bis 3 x täglich.

Sofern die Behandlung mit CGRP-Antagonisten oder/und CGRP-Release-Hemmern in Ergänzung zu einer üblichen Hormonsubstitution erfolgt, empfiehlt sich eine Verringerung der vorstehend angegebenen Dosierungen, wobei die Dosierung dann 1/5 der vorstehend angegebenen Untergrenzen bis zu 1/1 der vorstehend angegebenen Obergrenzen betragen kann.

Die erfindungsgemäß hergestellten Verbindungen können entweder alleine oder gegebenenfalls in Kombination mit anderen Wirksubstanzen zur Behandlung von Migräne intravenös, subkutan, intramuskulär, intrarektal, intranasal, durch Inhalation, transdermal oder oral erfolgen, wobei zur Inhalation insbesondere Aerosolformulierungen geeignet sind. Die Kombinationen können entweder simultan oder seguentiell verabreicht werden.

Als Kombinationspartner denkbare Wirkstoffklassen sind z.B. Angiotensin-II Rezeptorantagonisten, α -Agonisten und α -Antagonisten, 5-HT_{1B/1D}-Agonisten, Analgetica, Antidepressiva, Antiemetika, AMPA-Antagonisten, schwachen Antikonvulsiva, Antimuscarinika, β-Blocker, Calcium-Antagonisten, Corticosteroide, Histamin-H1-Rezeptorantagonisten. Neurokinin-Antagonisten, Ergot-Alkaloiden. Neuroleptika, nichtsteroidale Antiphlogistika, NO-Synthase-Hemmer, Prokinetika, selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer oder andere Antimigränemitteln, die zusammen mit einem oder mehreren inerten üblichen Trägerstoffen und/oder Verdünnungsmitteln, z.B. mit Maisstärke, Milchzucker, Rohrzucker, mikrokristalliner Polyvinylpyrrolidon, Zitronensäure, Weinsäure, Zellulose, Magnesiumstearat, Wasser, Wasser/Ethanol, Wasser/Glycerin, Wasser/Sorbit, Wasser/Polyethylenglykol, Propylenglykol, Cetylstearylalkohol, Carboxymethylcellulose oder fetthaltigen Substanzen wie Hartfett oder deren geeigneten Gemischen, in übliche galenische Zubereitungen wie Tabletten, Dragées, Kapseln, Pulver, Suspensionen, Lösungen, Dosieraerosole oder Zäpfchen eingearbeitet werden können.

5

0

5

20

30

Für die oben erwähnten Kombinationen kommen somit als weitere Wirksubstanzen beispielsweise die nicht-steroidalen Antiphlogistika Aceclofenac, Acemetacin, Acetylsalicylsäure, Azathioprin, Diclofenac, Diflunisal, Fenbufen, Fenoprofen, Flurbiprofen, Ibuprofen, Indometacin, Ketoprofen, Leflunomid, Lornoxicam, Mefenaminsäure, Naproxen, Phenylbutazon, Piroxicam, Sulfasalazin, Tenoxicam, Zomepirac oder deren physiologisch verträgliche Salze sowie Meloxicam und andere selektive COX2-Inhibitoren, wie beispielsweise Rofecoxib und Celecoxib, in Betracht.

Weiterhin können z.B. Candesartan, Eprosartan, Irbesartan, Losartan, Olmesartan, Tasosartan, Telmisartan, Valsartan, Duloxetin, Ergotamin, Dihydroergotamin, Metoclopramid, Domperidon, Diphenhydramin, Cyclizin, Promethazin, Chlorpromazin, Vigabatrin, Timolol, Isomethepten, Pizotifen, Botox, Gabapentin, Topiramat, Riboflavin, Montelukast, Lisinopril, Prochlorperazin, Dexamethason, Flunarizin, Dextropropoxyphen, Meperidin, Metoprolol, Propranolol, Nadolol, Atenolol, Clonidin, Indoramin, Carbamazepin, Phenytoin, Valproat, Amitryptilin, Lidocain oder Diltiazem und andere 5-HT_{1B/1D}-Agonisten wie z.B. Almotriptan, Avitriptan, Donitriptan, Eletriptan, Frovatriptan, Naratriptan, Rizatriptan, Sumatriptan und Zolmitriptan sowie deren physiologisch verträgliche Salze verwendet werden.

Die Dosis für diese Wirksubstanzen beträgt hierbei zweckmäßigerweise 1/5 der üblicherweise empfohlenen niedrigsten Dosierung bis zu 1/1 der normalerweise empfohlenen Dosierung, also beispielsweise 20 bis 100 mg Sumatriptan.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung der erfindungsgemäßen Verbindungen als wertvolle Hilfsmittel zur Erzeugung und Reinigung (Affinitätschromatographie) von Antikörpern sowie, nach geeigneter radioaktiver Markierung, beispielsweise durch Tritiierung geeigneter Vorstufen, beispielsweise durch katalytische Hydrierung mit Trithium oder Ersatz von Halogenatomen durch Tritium,

PCT/EP2005/003759

in RIA- und ELISA-Assays und als diagnostische bzw. analytische Hilfsmittel in der Neurotransmitter-Forschung.

Experimenteller Teil

5

0

5

Für die hergestellten Verbindungen liegen in der Regel IR-, ¹H-NMR und/oder Massenspektren vor.

Wenn nicht anders angegeben, werden Rr-Werte unter Verwendung von DC-Fertigplatten Kieselgel 60 F254 (E. Merck, Darmstadt, Artikel-Nr. 1.05714) ohne Kammersättigung bestimmt. Die bei den Fliessmitteln angegebenen Verhältnisse beziehen sich auf Volumeneinheiten der jeweiligen Lösungsmittel. Die angegebenen Volumeneinheiten bei NH₃ beziehen sich auf eine konzentrierte Lösung von NH₃ in Wasser. Soweit nicht anders vermerkt sind die bei den Aufarbeitungen der Reaktionslösungen verwendeten Säure-, Basen- und Salzlösungen wässrige Systeme der angegebenen Konzentrationen.

chromatographischen Reinigungen wird Zu Kieselgel Millipore der Firma (MATREXTM, 35 bis 70 µm) verwendet.

Die angegebenen HPLC-Daten werden unter nachstehend angeführten Parametern gemessen:

20

Methode A:

Analytische Säule: Zorbax-Säule (Agilent Technologies), SB (Stable Bond) C18; 3.5 um; 4.6 x 75 mm; Säulentemperatur: 30°C; Fluss: 0.8 mL / min; Injektionsvolumen: 5 uL; Detektion bei 254 nm

25

Zeit (min)	Volumenprozent Wasser	Volumenprozent Acetonitril		
	(mit 0.1% Ameisensäure)	(mit 0.1% Ameisensäure)		
0	95	5 .		
9	10	90		
10	10	90		
11	95	5		

Bei präparativen HPLC-Reinigungen werden in der Regel die gleichen Gradienten verwendet, die bei der Erhebung der analytischen HPLC-Daten benutzt wurden. Die Sammlung der Produkte erfolgt massengesteuert, die Produkt enthaltenden Fraktionen werden vereinigt und gefriergetrocknet.

Falls nähere Angaben zur Konfiguration fehlen, bleibt offen, ob es sich um reine Enantiomere handelt oder ob partielle oder gar völlige Racemisierung eingetreten ist.

5

In den Versuchsbeschreibungen werden die folgenden Abkürzungen verwendet:

DCM Dichlormethan

DMAP 4-Dimethylaminopyridin

0 DMF *N,N*-Dimethylformamid

EtOAc Essigsäureethylester

HCI Salzsäure

LiOH Lithiumhydroxid

MeOH Methanol

5 RT Raumtemperatur

TBTU 2-(1*H*-Benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium-Tetrafluorborat

THF Tetrahydrofuran

Beispiel 1

20

4-(2-Oxo-1,2-dihydro-imidazo[4,5-*c*]chinolin-3-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-[1,4']bipiperidinyl-1'-yl-2-oxo-ethylester

25

(1a) 4-(2-Oxo-1,2-dihydro-imidazo[4,5-c]chinolin-3-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)-2-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-phenyl)-1-ethoxycarbonyl-ethylester

Zu der Mischung aus 0.79 g (6.42 mmol) DMAP und 100 mL Pyridin wurden 1.29 g

(6.42 mmol) 4-Chlorameisensäure-4-nitrophenylester zugegeben und 1 h bei RT

gerührt. Danach wurde eine Lösung von 2.0 g (6.42 mmol) (R)-3-(4-Amino-3-chlor-5-trifluormethyl-phenyl)-2-hydroxy-propionsäureethylester in 15 mL Pyridin unter Rühren bei RT zugetropft und weitere 2 h bei RT gerührt. Anschließend wurde die Mischung mit 1.72 g (6.42 mmol) 3-Piperidin-4-yl-1,3-dihydro-imidazo[4,5-c]chinolin-2-on versetzt und 2 Tage bei RT gerührt. Das Reaktionsgemisch wurde unter vermindertem Druck eingeengt, mit 200 mL EtOAc und 200 mL 15% K₂CO₃-Lösung versetzt, die organische Phase abgetrennt, getrocknet und eingeengt. Der Rückstand wurde säulenchromatographisch (Kieselgel, Gradient DCM zu DCM/MeOH/NH₃ 0:95:5) gereinigt.

0 Ausbeute:

5

5

:0

1.2 g (31% der Theorie)

ESI-MS:

 $(M+H)^{+} = 606/608 (CI)$

Retentionszeit (HPLC):

6.7 min (Methode A)

(1b) 4-(2-Oxo-1,2-dihydro-imidazo[4,5-c]chinolin-3-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(R)-2-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-phenyl)-1-carboxy-ethylester

1.20 g (1.98 mmol) 4-(2-Oxo-1,2-dihydro-imidazo[4,5-c]chinolin-3-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(R)-2-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-phenyl)-1-ethoxycarbonyl-ethylester, gelöst in 30 mL THF, wurde bei RT mit einer Lösung von 74 mg (3.0 mmol) LiOH in 30 mL Wasser versetzt und 3 h bei RT gerührt. Das Reaktionsgemisch wurde unter vermindertem Druck eingeengt, der Rückstand mit 100 mL Wasser versetzt und mit 1 M HCl angesäuert. Der Niederschlag wurde abgesaugt, mit 50 mL Wasser gewaschen und im Umlufttrockenschrank getrocknet.

Ausbeute:

0.88 g (77% der Theorie)

ESI-MS:

 $(M+H)^{+} = 578/580 (CI)$

15 Retentionszeit (HPLC):

5.8 min (Methode A)

- (1c) 4-(2-Oxo-1,2-dihydro-imidazo[4,5-c]chinolin-3-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(R)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-[1,4']bipiperidinyl-1'-yl-2-oxo-ethylester
- Eine Mischung aus 80 mg (0.138 mmol) 4-(2-Oxo-1,2-dihydro-imidazo[4,5-c]chinolin-3-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(R)-2-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-phenyl)-1-carboxy-ethylester, 23.6 mg (0.14 mmol) [1,4']Bipiperidinyl, 46.6 mg (0.14 mmol) TBTU, 0.041 mL (0.28 mmol) Triethylamin und 1.8 mL DMF wurde über Nacht bei RT

gerührt. Das Reaktionsgemisch wurde direkt mittels HPLC-MS (Säule: Agilent Zorbax Stable Bond RP C18, 5 µM, 30x100 mm; Fluss 30 mL/min; Gradient: Wasser/Acetonitril) und anschließender Lyophilisation aufgereinigt.

Ausbeute:

77 mg (76% der Theorie)

5 ESI-MS:

 $(M+H)^+ = 728/730$ (CI)

Retentionszeit (HPLC):

4.8 min (Methode A)

Beispiel 2

4-(2-Oxo-1,2-dihydro-imidazo[4,5-c]chinolin-3-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(R)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-[4-(4-methyl-piperazin-1-yl)-piperidin-1-yl]-2-oxo-ethylester

5

Analog Beispiel (1c) wurden aus 80 mg (0.14 mmol) 4-(2-Oxo-1,2-dihydro-imidazo-[4,5-c]chinolin-3-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(R)-2-(4-amino-3-chlor-5-trifluor-methyl-phenyl)-1-carboxy-ethylester und 25 mg (0.14 mmol) 1-Methyl-4-piperidin-4-yl-piperazin das Produkt erhalten.

o Ausbeute:

76 mg (74% der Theorie)

ESI-MS:

 $(M+H)^{+} = 743/745$ (CI)

Retentionszeit (HPLC):

5.5 min (Methode A)

Beispiel 3

:5

4-(2-Oxo-1,2-dihydro-imidazo[4,5-c]chinolin-3-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-[4-(1-methyl-piperidin-4-yl)-piperazin-1-yl]-2-oxo-ethylester

Analog Beispiel (1c) wurden aus 80 mg (0.14 mmol) 4-(2-Oxo-1,2-dihydro-imidazo-[4,5-c]chinolin-3-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)-2-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-phenyl)-1-carboxy-ethylester und 26 mg (0.14 mmol) 1-(1-Methyl-piperidin-4-yl)-piperazin das Produkt erhalten.

Ausbeute:

68 mg (66% der Theorie)

ESI-MS:

5

0

5

 $(M+H)^{+} = 743/745$ (CI)

Retentionszeit (HPLC):

4.0 min (Methode A)

Beispiel 4

4-(2-Oxo-1,2-dihydro-imidazo[4,5-c]chinolin-3-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-(1'-methyl-[4,4']bipiperidinyl-1-yl)-2-oxo-ethyl ester

Analog Beispiel (1c) wurden aus 80 mg (0.14 mmol) 4-(2-Oxo-1,2-dihydro-imidazo-[4,5-c]chinolin-3-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)-2-(4-amino-3-chlor-5-trifluor-methyl-phenyl)-1-carboxy-ethylester und 25 mg (0.14 mmol) 1-Methyl-[4,4']bipiperidinyl das Produkt erhalten.

Ausbeute:

73 mg (71% der Theorie)

ESI-MS:

 $(M+H)^{+} = 742/744$ (CI)

25 Retentionszeit (HPLC):

4.9 min (Methode A)

Beispiel 5

5

)

5

4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-[4-(4-methyl-piperazin-1-yl)-piperidin-1-yl]-2-oxo-ethylester

(5a) 4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)-2-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-phenyl)-1-ethoxycarbonyl-ethylester

Analog Beispiel (1a) wurden aus 2.0 g (6.42 mmol) (*R*)-3-(4-Amino-3-chlor-5-trifluormethyl-phenyl)-2-hydroxy-propionsäureethylester und 2.41 g (65%, 6.42 mmol)

5-Phenyl-2-piperidin-4-yl-2,4-dihydro-1,2,4-triazol-3-on das Produkt erhalten werden.

Ausbeute:

1.0 g (27% der Theorie)

ESI-MS:

 $(M+H)^{+} = 582/584$ (CI)

Retentionszeit (HPLC):

8.9 min (Methode A)

(5b) 4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)-2-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-phenyl)-1-carboxy-ethylester

Analog Beispiel (1b) wurden aus 1.0 g (1.72 mmol) 4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)-2-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-phenyl)-1-ethoxycarbonyl-ethylester und 64 mg (2.60 mmol) LiOH das Produkt erhalten werden.

Ausbeute:

0.91 g (96% der Theorie)

5 ESI-MS:

 $(M+H)^{+} = 554/556 (CI)$

Retentionszeit (HPLC):

7.5 min (Methode A)

(5c) 4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-[4-(4-methyl-piperazin-1-yl)-piperidin-1-yl]-2-oxo-ethylester

Analog Beispiel (1c) wurden aus 77 mg (0.14 mmol) 4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)-2-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-phenyl)-1-carboxy-ethylester und 25 mg (0.14 mmol) 1-Methyl-4-piperidin-4-yl-piperazin das Produkt erhalten.

Ausbeute:

84 mg (84% der Theorie)

ESI-MS:

5

5

 $(M+H)^{+} = 719/721 (CI)$

0 Retentionszeit (HPLC):

5.4 min (Methode A)

Beispiel 6

4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure (R)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-[4-(1-methyl-piperidin-4-yl)-piperazin-1-yl]-2-oxo-ethylester

Analog Beispiel (1c) wurden aus 77 mg (0.14 mmol) 4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)-2-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-phenyl)-1-carboxy-ethylester und 26 mg (0.14 mmol) 1-(1-Methyl-piperidin-4-yl)-piperazin das Produkt erhalten.

Ausbeute:

84 mg (84% der Theorie)

25 ESI-MS:

 $(M+H)^{+} = 719/721 (CI)$

Retentionszeit (HPLC):

5.0 min (Methode A)

Beispiel 7

4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(R)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-(1'-methyl-[4,4']bipiperidinyl-1-yl)-2-oxo-ethyl ester

Analog Beispiel (1c) wurden aus 77 mg (0.14 mmol) 4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)-2-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-phenyl)-1-carboxy-ethylester und 25 mg (0.14 mmol) 1-Methyl-[4,4']bipiperidinyl das Produkt erhalten.

Ausbeute:

76 mg (76% der Theorie)

ESI-MS:

5

 $(M+H)^{+} = 718/720 (CI)$

Retentionszeit (HPLC):

6.0 min (Methode A)

5 Beispiel 8

4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-[1,4']bipiperidinyl-1'-yl-2-oxo-ethylester

20

25

Analog Beispiel (1c) wurden aus 77 mg (0.14 mmol) 4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)-2-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-phenyl)-1-carboxy-ethylester und 24 mg (0.14 mmol) [1,4']Bipiperidinyl das Produkt erhalten.

Ausbeute:

71 mg (73% der Theorie)

ESI-MS:

 $(M+H)^{+} = 704/706 (CI)$

Retentionszeit (HPLC):

6.0 min (Methode A)

5 Beispiel 9

4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-[4-(1-aza-bicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-piperazin-1-yl]-2-oxo-ethylester

0

Analog Beispiel (1c) wurden aus 77 mg (0.14 mmol) 4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)-2-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-phenyl)-1-carboxy-ethylester und 27 mg (0.14 mmol) 3-Piperazin-1-yl-1-aza-bicyclo-[2.2.2]octan das Produkt erhalten.

Ausbeute:

13 mg (13% der Theorie)

ESI-MS:

 $(M+H)^{+} = 731/733(CI)$

Retentionszeit (HPLC):

5.6 min (Methode A)

:0

Die nachfolgenden Beispiele beschreiben die Herstellung pharmazeutischer Anwendungsformen, die als Wirkstoff eine beliebige Verbindung der allgemeinen Formel (I) enthalten:

Beispiel I:

Kapseln zur Pulverinhalation mit 1 mg Wirkstoff

Zusammensetzung:

1 Kapsel zur Pulverinhalation enthält:

Wirkstoff

1.0 mg

Milchzucker

20.0 mg

Hartgelatinekapseln

50.0 mg

5

0

71.0 mg

Herstellungsverfahren:

Der Wirkstoff wird auf die für Inhalativa erforderliche Korngröße gemahlen. Der gemahlene Wirkstoff wird mit dem Milchzucker homogen gemischt. Die Mischung wird in Hartgelatinekapseln abgefüllt.

Beispiel II:

Inhalationslösung für Respimat® mit 1 mg Wirkstoff

5

20

Zusammensetzung:

1 Hub enthält:

Wirkstoff

1.0 mg

Benzalkoniumchlorid

0.002 mg

Dinatriumedetat

0.0075 mg

μl

Wasser gereinigt ad

15.0

Herstellungsverfahren:

Der Wirkstoff und Benzalkoniumchlorid werden in Wasser gelöst und in Respimat[®]-Kartuschen abgefüllt.

Beispiel III:

30 Inhalationslösung für Vernebler mit 1 mg Wirkstoff

Zusammensetzung:

1 Fläschchen enthält:

164

Wirkstoff 0.1 g

Natriumchlorid 0.18 g

Benzalkoniumchlorid 0.002 g

Wasser gereinigt ad 20.0 ml

5

Herstellungsverfahren:

Wirkstoff, Natriumchlorid und Benzalkoniumchlorid werden in Wasser gelöst.

Beispiel IV:

10

Treibgas-Dosieraerosol mit 1 mg Wirkstoff

Zusammensetzung:

1 Hub enthält:

5 Wirkstoff 1.0 mg

Lecithin 0.1 %

Treibgas ad 50.0 µl

Herstellungsverfahren:

Der mikronisierte Wirkstoff wird in dem Gemisch aus Lecithin und Treibgas homogen suspendiert. Die Suspension wird in einen Druckbehälter mit Dosierventil abgefüllt.

Beispiel V:

Nasalspray mit 1 mg Wirkstoff

Zusammensetzung:

Wirkstoff 1.0 mg

Natriumchlorid 0.9 mg

30 Benzalkoniumchlorid 0.025 mg

Dinatriumedetat 0.05 mg

Wasser gereinigt ad 0.1 ml

Herstellungsverfahren:

Der Wirkstoff und die Hilfsstoffe werden in Wasser gelöst und in ein entsprechendes Behältnis abgefüllt.

5 Beispiel VI:

Injektionslösung mit 5 mg Wirksubstanz pro 5 ml

Zusammensetzung:

0 Wirksubstanz 5 mg
Glucose 250 mg
Human-Serum-Albumin 10 mg
Glykofurol 250 mg
Wasser für Injektionszwecke ad 5 ml

5

Herstellung:

Glykofurol und Glucose in Wasser für Injektionszwecke auflösen (Wfl); Human-Serum-Albumin zugeben; Wirkstoff unter Erwärmen auflösen; mit Wfl auf Ansatzvolumen auffüllen; unter Stickstoff-Begasung in Ampullen abfüllen.

:0

Beispiel VII:

Injektionslösung mit 100 mg Wirksubstanz pro 20 ml

25 Zusammensetzung:

	Wirksubstanz	100 mg
	Monokaliumdihydrogen-	
	phosphat = KH_2PO_4	12 mg
	Dinatriumhydrogen	
10	phosphat = Na ₂ HPO ₄ ·2H ₂ O	2 mg
	Natriumchlorid	180 mg
	Human-Serum-Albumin	50 mg
	Polysorbat 80	20 mg

Wasser für Injektionszwecke ad 20 ml

Herstellung:

Polysorbat 80, Natriumchlorid, Monokaliumdihydrogenphosphat und Dinatriumhydrogenphosphat in Wasser für Injektionszwecke (Wfl) auflösen; Human-Serum-Albumin zugeben; Wirkstoff unter Erwärmen auflösen; mit Wfl auf Ansatzvolumen auffüllen; in Ampullen abfüllen.

Beispiel VIII:

Lyophilisat mit 10 mg Wirksubstanz

Zusammensetzung:

Wirksubstanz

10 mg

5 Mannit

)

300 mg

Human-Serum-Albumin

20 mg

Herstellung:

Mannit in Wasser für Injektionszwecke (WfI) auflösen; Human-Serum-Albumin zugeben; Wirkstoff unter Erwärmen auflösen; mit Wfl auf Ansatzvolumen auffüllen; in Vials abfüllen; gefriertrocknen.

Lösungsmittel für Lyophilisat:

Polysorbat 80 = Tween 80

20 mg

5 Mannit

10

200 mg

Wasser für Injektionszwecke ad

10 ml

Herstellung:

Polysorbat 80 und Mannit in Wasser für Injektionszwecke (Wfl) auflösen; in Ampullen abfüllen.

Beispiel IX:

Tabletten mit 20 mg Wirksubstanz

Zusammensetzung:

Wirksubstanz 20 mg
Lactose 120 mg
Maisstärke 40 mg
Magnesiumstearat 2 mg
Povidon K 25 18 mg

o <u>Herstellung:</u>

Wirksubstanz, Lactose und Maisstärke homogen mischen; mit einer wässerigen Lösung von Povidon granulieren; mit Magnesiumstearat mischen; auf einer Tablettenpresse abpressen; Tablettengewicht 200 mg.

5 Beispiel X:

Kapseln mit 20 mg Wirksubstanz

Zusammensetzung:

0	Wirksubstanz	20	mg
	Maisstärke	80	mg
	Kieselsäure. hochdispers	5	mg
	Magnesiumstearat	2.5	5 mg

5 <u>Herstellung:</u>

Wirksubstanz, Maisstärke und Kieselsäure homogen mischen; mit Magnesiumstearat mischen; Mischung auf einer Kapselfüllmaschine in Hartgelatine-Kapseln Grösse 3 abfüllen.

Beispiel XI:

Zäpfchen mit 50 mg Wirksubstanz

Zusammensetzung:

Wirksubstanz

50 mg

Hartfett (Adeps solidus) q.s. ad

1700 mg

5 Herstellung:

Hartfett bei ca. 38°C aufschmelzen; gemahlene Wirksubstanz im geschmolzenen Hartfett homogen dispergieren; nach Abkühlen auf ca. 35°C in vorgekühlte Formen ausgiessen.

o Beispiel XII:

Injektionslösung mit 10 mg Wirksubstanz pro 1 ml

Zusammensetzung:

15 Wirksubstanz

10 mg

Mannitol

50 mg

Human-Serum-Albumin

I luman-Serum-Albumin

10 mg

Wasser für Injektionszwecke ad

1 ml

20 Herstellung:

Mannitol in Wasser für Injektionszwecke auflösen (WfI); Human-Serum-Albumin zugeben; Wirkstoff unter Erwärmen auflösen; mit Wfl auf Ansatzvolumen auffüllen; unter Stickstoff-Begasung in Ampullen abfüllen.

Patentansprüche

1. CGRP-Antagonisten der allgemeinen Formel

in der

5

0 A einen Rest der Formel

15 X ein Sauerstoffatom, eine Methylen- oder NH-Gruppe,

R¹ einen Rest der Formel

20

-NR²R³ einen Rest der Formel

10 bedeutet,

20

5

deren Tautomere, deren Diastereomere, deren Enantiomere, deren Hydrate, deren Gemische und deren Salze sowie die Hydrate der Salze.

2. Die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) gemäß Anspruch 1, die in der Tabelle der Beschreibung mit (1) bis (2353) fortlaufend nummeriert sind,

deren Tautomere, deren Diastereomere, deren Enantiomere, deren Hydrate, deren Gemische und deren Salze sowie die Hydrate der Salze.

- 3. Folgende Verbindungen der allgemeinen Formel (I) gemäß Anspruch 1:
- (1) 4-(2-Oxo-1,2-dihydro-imidazo[4,5-c]chinolin-3-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(R)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-[1,4']bipiperidinyl-1'-yl-2-oxo-ethylester,

20

- (2) 4-(2-Oxo-1,2-dihydro-imidazo[4,5-c]chinolin-3-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(R)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-[4-(4-methyl-piperazin-1-yl)-piperidin-1-yl]-2-oxo-ethylester,
- 5 (3) 4-(2-Oxo-1,2-dihydro-imidazo[4,5-c]chinolin-3-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(R)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-[4-(1-methyl-piperidin-4-yl)-piperazin-1-yl]-2-oxo-ethylester,
- (4) 4-(2-Oxo-1,2-dihydro-imidazo[4,5-c]chinolin-3-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(R)1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-(1'-methyl-[4,4']bipiperidinyl-1-yl)2-oxo-ethylester,
- (5) 4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-[4-(4-methyl-piperazin-1-yl)-piperidin-1-yl]-2-oxo-ethylester,
 - (6) 4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure (R)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-[4-(1-methyl-piperidin-4-yl)-piperazin-1-yl]-2-oxo-ethylester,
 - (7) 4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(R)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-(1'-methyl-[4,4']bipiperidinyl-1-yl)-2-oxo-ethylester,
- 25 (8) 4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)-1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-[1,4']bipiperidinyl-1'-yl-2-oxo-ethylester,
- (9) 4-(5-Oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-[1,2,4]triazol-1-yl)-piperidin-1-carbonsäure-(*R*)1-(4-amino-3-chlor-5-trifluormethyl-benzyl)-2-[4-(1-aza-bicyclo[2.2.2]oct-3-yl)piperazin-1-yl]-2-oxo-ethylester,

WO 2005/100352 PCT/EP2005/003759

deren Tautomere, deren Diastereomere, deren Enantiomere, deren Hydrate, deren Gemische und deren Salze sowie die Hydrate der Salze.

- 4. Physiologisch verträgliche Salze der Verbindungen gemäß einem der 5 Ansprüche 1 bis 3 mit anorganischen oder organischen Säuren.
 - 5. Arzneimittel, enthaltend eine Verbindung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3 oder ein physiologisch verträgliches Salz gemäß Anspruch 4 neben gegebenenfalls einem oder mehreren inerten Trägerstoffen und/oder Verdünnungsmitteln.
 - 6. Verwendung einer Verbindung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4 zur Herstellung eines Arzneimittels zur akuten und prophylaktischen Behandlung von Kopfschmerzen, insbesondere Migräne- bzw. Cluster-Kopfschmerz.

10

20

25

30

- 7. Verwendung einer Verbindung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4 zur Herstellung eines Arzneimittels zur Bekämpfung von nicht-insulinabhängigem Diabetes-mellitus (NIDDM).
 - 8. Verwendung einer Verbindung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4 zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von CRPS1 (complex regional pain syndrome), von cardiovaskulären Erkrankungen, von Morphintoleranz, von Chlostritiumtoxin-bedingten Durchfallerkrankungen, von Erkrankungen der Haut, insbesondere von thermischen und strahlungsbedingten Schäden inklusive Sonnenbrand, von entzündlichen Erkrankungen wie insbesondere entzündlicher Gelenkerkrankungen wie Arthritis, von neurogenen Entzündungen der oralen Mucosa, von entzündlichen Lungenerkrankungen, von allergischer Rhinitis, von Asthma, von Erkrankungen, die mit einer überschießenden Gefäßerweiterung und dadurch bedingter verringerter Gefäßdurchblutung, wie insbesondere Schock oder Sepsis, einhergeht, zur Linderung von Schmerzzuständen im allgemeinen oder zu präventiven oder akut therapeutischen Beeinflussung der durch Gefäßerweiterung und erhöhten Blutfluss verursachten Symptomatik von Hitzewallungen menopausaler, östrogendefizienter Frauen sowie hormonbehandelter Prostatakarzinompatienten.

5

10

15

25

- 9. Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass auf nichtchemischem Weg eine Verbindung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4 in einen oder mehrere inerte Trägerstoffe und/oder Verdünnungsmittel eingearbeitet wird.
- 10. Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der allgemeinen Formel (I) nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
- (a) zur Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel

in der X das Sauerstoffatom oder die NH-Gruppe bedeutet und A und R¹ bis R³ wie in Anspruch 1 definiert sind, ein Piperidin der allgemeinen Formel

in der R¹ in Anspruch 1 definiert ist,

20 (i) mit einem Kohlensäurederivat der allgemeinen Formel

in der G eine nucleofuge Gruppe, die gleich oder verschieden sein kann, bedeutet, mit der Maßgabe, dass X die NH-Gruppe darstellt, oder

(ii) mit einem Kohlensäurederivat der allgemeinen Formel

in der G eine nucleofuge Gruppe, die gleich oder verschieden sein kann, bedeutet, mit der Maßgabe, dass X das Sauerstoffatom bedeutet,

und mit einer Verbindung der allgemeinen Formel

10

15

20

5

in der X das Sauerstoffatom oder eine -NH-Gruppe bedeutet und A, R^2 und R^3 wie in Anspruch 1 definiert sind, mit der Maßgabe, dass R^2 und R^3 keine weitere freie primäre oder sekundäre aliphatische Aminofunktion enthalten, umgesetzt wird; oder

(b) zur Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel

in der X die Methylengruppe bedeutet und A und R¹ bis R³ wie in Anspruch 1 definiert sind, mit der Maßgabe, dass keine weitere freie primäre oder sekundäre aliphatische Aminofunktion enthalten, eine Carbonsäure der allgemeinen Formel

5

10

in der A, R² und R³ wie in Anspruch 1 definiert sind, mit einem Piperidin der allgemeinen Formel

in der R¹ wie in Anspruch 1 definiert ist, gekuppelt wird; oder

(c) zur Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel

in der X die Methylengruppe bedeutet und A, R² und R³ wie in Anspruch 1 definiert sind, mit der Maßgabe, dass diese Gruppen kein freies primäres oder sekundäres Amin enthalten, eine Verbindung der allgemeinen Formel

in der A, R² und R³ wie in Anspruch 1 definiert sind, mit der Maßgabe, dass R² und R³ kein freies primäres oder sekundäres Amin enthalten, und Nu eine Austrittsgruppe bedeutet, mit einem Piperidin der allgemeinen Formel

5

in der R1 in Anspruch 1 definiert ist, gekuppelt wird; oder

(d) zur Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel

$$\mathbb{R}^1$$
 \mathbb{R}^2
 \mathbb{R}^3
 \mathbb{R}^3
 \mathbb{R}^3

o in der A, X und R^1 bis R^3 wie in Anspruch 1 definiert sind, eine Carbonsäure der allgemeinen Formel

- in der A, X und R¹ wie in Anspruch 1 definiert sind, mit einem Amin der allgemeinen Formel HNR²R³, in der R² und R³ wie in Anspruch 1 definiert sind, mit der Maßgabe, dass sie keine weitere freie primäre oder sekundäre aliphatische Aminofunktion enthalten, gekuppelt wird; oder
- 20 (e) zur Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel

$$\begin{array}{c|c} & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & \\ & & \\ & \\ & & \\ & \\ & \\ & & \\ & \\ & & \\ & \\ & \\ & \\ & & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\$$

in der A, X und R¹ bis R³ wie in Anspruch 1 definiert sind, mit der Maßgabe, dass kein freies primäres oder sekundäres Amin enthalten ist, eine Verbindung der allgemeinen Formel

5

10

15

20

25

in der A, X und R¹ wie in Anspruch 1 definiert sind und Nu eine Austrittsgruppe bedeutet, mit einem Amin der allgemeinen Formel HNR²R³, in der R² und R³ wie in Anspruch 1 definiert sind, mit der Maßgabe, dass keine freie Carbonsäure- und/oder keine weitere freie primäre oder sekundäre aliphatische Aminofunktion enthalten ist, gekuppelt wird, und

erforderlichenfalls ein bei den vorstehend beschriebenen Umsetzungen verwendeter Schutzrest wieder abgespalten wird und/oder

gegebenenfalls verwendete Präcurserfunktionen in einer so erhaltenen Verbindung abgewandelt werden und/oder

gewünschtenfalls eine so erhaltene Verbindung der allgemeinen Formel (I) in ihre Stereoisomere aufgetrennt wird und/oder

eine so erhaltene Verbindung der allgemeinen Formel (I) in ihre Salze, insbesondere für die pharmazeutische Anwendung in ihre physiologisch verträglichen Salze übergeführt wird.

RNATIONAL SEARCH REPORT

onal Application No PCT/EP2005/003759

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C07D471/04 C07D235/26 C07D495/04 C07D401/14 CO7D249/12 C07D519/00 A61K31/437 C07D471/08 C07D451/04 C07D487/08 A61P25/06 A61K31/4184 A61K31/4196 A61K31/519 A61K31/551

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) $IPC \ 7 \ C07D \ A61K \ A61P$

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, BIOSIS, INSPEC, CHEM ABS Data

C. DOCUMI	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		,
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	ne relevant passages	Relevant to claim No.
A	MALLEE J J ET AL: "Receptor Activity-modifying Protein 1 D the Species Selectivity of Non CGRP Receptor Antagonists" JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTR SOCIETY OF BIOLOGICAL CHEMISTS MD, US, vol. 277, no. 16, 19 April 2002 (2002-04-19), pa 14294-14298, XP002271313 ISSN: 0021-9258 the whole document	-peptide Y, AMERICAN , BALTIMORE,	1-10
Y	US 6 344 449 B1 (RUDOLF KLAUS 5 February 2002 (2002-02-05) the whole document	ET AL) -/	1–10
X Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	in annex.
"A" docume consider filing consider which citatio "O" docume other "P" docume other "P" docume other "P" docume other "P" docume "P" docume other "P" docume ot	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international date ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another or or other special reason (as specified) lent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed	"T" later document published after the intorpriority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the described to involve an inventive step when the described by the cannot be considered to involve an inventive step when the described by the cannot be considered to involve an inventive step when the described by the cannot be considered to involve an inventive such combination being obvious in the art. "&" document member of the same patents."	the application but secry underlying the claimed invention it be considered to ocument is taken alone claimed invention eventive step when the ore other such docupus to a person skilled
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	
1	0 August 2005	19/08/2005	
Namo and I	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	

IN RNATIONAL SEARCH REPORT

		PCT/EP2005/003759
C.(Continua	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	, w
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
,	WO 03/076432 A (BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG; HURNAUS, RUDOLF; RUDOLF, KL) 18 September 2003 (2003-09-18) abstract; claims 1-17; examples 53-76	1-10
	DE 102 27 294 A1 (BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG) 8 January 2004 (2004-01-08) the whole document	1-10
°,X	DE 102 50 080 A1 (B0EHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG) 13 May 2004 (2004-05-13) abstract; claims 1-16; examples 17,19,21,22,24-27	1-10
	x **	,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
	Y.	
		-36 ·
		-96

IN RNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Inte Carional Application No PCT/EP2005/003759

	ent document n search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 6	5344449	B1	05-02-2002	DE AUUG GRANZE WEELEHHIJPPOZLTTUZHKUSAURAS HKRDPPSKRWWSAURAS HKRDS	19636623 A1 19720011 A1 266673 T 721035 B2 4119697 A 64214 B1 103250 A 9712023 A 2262818 A1 1230196 A 2900823 A3 59711622 D1 927192 T3 4037 B1 9900115 A 9811128 A1 1440976 A1 0927192 A1 2221691 T3 1021192 A1 270481 A1 21045 A 3483893 B2 2000505100 T 2003300959 A 991130 A 334543 A 331989 A1 927192 T 927192 T1 29799 A3 9900537 T2 477792 B 498076 B 2001036946 A1 9708083 A 9904501 A2 200044040 A 68338 C2 2004214819 A1	12-03-1998 19-11-1998 15-05-2004 22-06-2000 02-04-1998 31-05-2000 31-08-1999 19-03-1998 29-09-1999 16-06-1999 17-06-2004 13-09-2004 25-12-2003 15-10-1999 19-03-1998 28-07-2004 07-07-1999 01-01-2005 30-04-2004 31-08-1998 08-04-1999 06-01-2004 25-04-2000 21-10-2003 05-05-1999 23-06-2000 16-08-1999 30-09-2004 31-10-2004 13-03-2000 21-07-1999 01-03-2002 11-08-2002 01-11-2001 17-12-1999 28-04-2000 15-07-2000 15-07-2000 15-07-2000 28-04-2000
WO C	03076432	A	18-09-2003	DE AU CA WO EP US	10211770 A1 2003212323 A1 2476031 A1 03076432 A1 1487821 A1 2003236282 A1	02-10-2003 22-09-2003 18-09-2003 18-09-2003 22-12-2004 25-12-2003
DE 1	10227294	A1	08-01-2004	AU CA WO EP US	2003246414 A1 2487716 A1 2004000289 A2 1517674 A2 2004076587 A1	06-01-2004 31-12-2003 31-12-2003 30-03-2005 22-04-2004
	10250080	A1	13-05-2004	AU CA WO EP	2003276156 A1 2503455 A1 2004037810 A1 1558600 A1	13-05-2004 06-05-2004 06-05-2004 03-08-2005

INTERNATIONA RECHERCHENBERICHT

Intersconales Aktenzeichen
PCT/EP2005/003759

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 C07D471/04 C07D235/26 C07D249/12 C07D495/04 C07D401/14 C07D487/08 C07D471/08 C07D451/04 C07D519/00 A61K31/437 A61K31/4184 A61K31/4196 A61K31/519 A61K31/551 A61P25/06

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $IPK\ 7\ C07D\ A61K\ A61P$

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ, BIOSIS, INSPE	C, CHEM ABS Data	
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Α	MALLEE J J ET AL: "Receptor Activity-modifying Protein 1 Dete the Species Selectivity of Non-pe CGRP Receptor Antagonists" JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, SOCIETY OF BIOLOGICAL CHEMISTS, B MD, US, Bd. 277, Nr. 16, 19. April 2002 (2002-04-19), Seit 14294-14298, XP002271313 ISSN: 0021-9258 das ganze Dokument	ptide AMERICAN ALTIMORE,	1–10
Υ	US 6 344 449 B1 (RUDOLF KLAUS ET 5. Februar 2002 (2002-02-05) das ganze Dokument	AL)	1–10
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
° Besondere "A" Veröffe aber n "E" älteres Anmel "L" Veröffer schein andere soll oc ausge "O" Veröffe eine B "P" Veröffe	Rategorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, icht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen dedatum veröffentlicht worden ist ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie führt) ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, enutzung, eine Ausstellung oder andere Maβnahmen bezieht	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlich Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedet kann allein aufgrund dieser Veröffentlicher Tätigkeit beruhend betre "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedet kann nicht als auf erfinderischer Tätigk werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselber	r zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden utung; die beanspruchte Erfindung chung nicht als neu oder auf achtet werden utung; die beanspruchte Erfindung teit beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und naheliegend ist
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Re	cherchenberichts
1	0. August 2005	19/08/2005	<u></u>
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Bevollmächtigter Bediensteter Papathoma, S	

INTERNATIONA RECHERCHENBERICHT

	ezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.
		enden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	NO 02/076422 A (DOCUDINGED INCELLIEIM		
	WO 03/076432 A (BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG; HURNAUS, RUDOLF; RUDOLF, KL) 18. September 2003 (2003-09-18) Zusammenfassung; Ansprüche 1-17; Beispiele 53-76		1-10
Y	DE 102 27 294 A1 (BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG) 8. Januar 2004 (2004-01-08) das ganze Dokument		1-10
P,X	DE 102 50 080 A1 (BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG) 13. Mai 2004 (2004-05-13) Zusammenfassung; Ansprüche 1-16; Beispiele 17,19,21,22,24-27		1-10
V			
			0
	*		
	*		
	·		
	`x		
			,
			1

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Interior nales Aktenzeichen
PCT/EP2005/003759

lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung		ed(er) der ntfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 6344449 B1	05-02-2002	DE 19 AT AU AU AU BG BG BR 9 CA 2: CN 1: CZ 99 DK EA EE 99 WO 98 EP 10 EP 2000 JP 2003 NO NZ PL PT SI SK TR PT SI SK TR 9 TW US 2001 ZA 9 HU ZA 9 KR 2000 UA	636623 A1 720011 A1 266673 T 721035 B2 119697 A 64214 B1 103250 A 712023 A 262818 A1 230196 A ,C 900823 A3 711622 D1 927192 T3 4037 B1 900115 A 811128 A1 440976 A1 927192 A1 221691 T3 021192 A1 221691 T3 021192 A1 221691 T3 021192 A1 27048 A1 21045 A 483893 B2 505100 T 300959 A 991130 A 334543 A 331989 A1 927192 T	12-03-1998 19-11-1998 15-05-2004 22-06-2000 02-04-1998 31-05-2000 31-08-1999 19-03-1998 29-09-1999 16-06-1999 17-06-2004 13-09-2004 25-12-2003 15-10-1999 19-03-1998 28-07-2004 07-07-1999 01-01-2005 30-04-2004 31-08-1998 08-04-1999 06-01-2004 25-04-2000 21-10-2003 05-05-1999 23-06-2000 16-08-1999 30-09-2004 31-10-2004 13-03-2000 21-07-1999 01-03-2002 11-08-2002 01-11-2001 17-12-1999 28-04-2000 15-07-2000 15-08-2000 28-10-2004
WO 03076432 A	18-09-2003	AU 2003 CA 2 WO 03 EP 1	211770 A1 212323 A1 476031 A1 076432 A1 487821 A1 236282 A1	02-10-2003 22-09-2003 18-09-2003 18-09-2003 22-12-2004 25-12-2003
DE 10227294 A1	08-01-2004	CA 2 WO 2004 EP 1	246414 A1 487716 A1 000289 A2 517674 A2 076587 A1	06-01-2004 31-12-2003 31-12-2003 30-03-2005 22-04-2004
DE 10250080 A1		CA 2 WO 2004	276156 A1 503455 A1 037810 A1 558600 A1	13-05-2004 06-05-2004 06-05-2004 03-08-2005